

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України  
13.07.2018 № 1309

Реєстраційне посвідчення  
№ UA/7830/01/01

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
для медичного застосування лікарського засобу

**АЛТЕЇ КОРЕНІ**  
(ALTHAEAE RADICES)

**Склад:**

діюча речовина: алтеї корені.

**Лікарська форма.** Корені.

**Основні фізико-хімічні властивості:** шматочки коренів різної форми. Колір білий, жовтувато-білий, від сірувато-блізкого до сірувато-коричневого, сіруватий.

**Фармакотерапевтична група.** Відхаркувальні засоби. Код ATX R05C A05.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.**

Біологічно активні речовини лікарського засобу чинять протизапальну, пом'якшувальну, відхаркувальну, обволікаючу дію, прискорюють регенерацію тканин, зменшують запальний процес.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Захворювання дихальних шляхів (хронічні бронхіти, трахеїти, ларингіти, пневмонії, бронхіальна астма, коклюш).

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до біологічно активних речовин препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Уповільнює всмоктування інших препаратів, що застосовуються одночасно. При сумісному застосуванні з протизапальними засобами препарат пролонгує їх дію, підвищує ефективність і знижує побічну дію. Як відхаркувальний засіб можна поєднувати з натрієм бікарбонатом. При сумісному застосуванні з протикашльовими препаратами можливе скупчення мокротиння у дихальних шляхах, тому не рекомендується застосовувати одночасно з протикашльовими засобами (наприклад кодейном); при сумісному застосуванні з антибіотиками підвищує концентрацію антибіотиків у дихальних шляхах.

**Особливості застосування.**

При застосуванні препарату слід дотримуватися рекомендацій лікаря. Не рекомендується призначення при сухому кашлі, оскільки можливе його посилення. Якщо під час лікування розвивається задишка, підвищення температури або з'являється гнійне мокротиння, необхідно негайно звернутися до лікаря.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Прийом препарату не рекомендується у зв'язку з відсутністю досвіду його застосування у період вагітності або годування груддю. При необхідності застосування годування груддю слід припинити.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

#### **Спосіб застосування та дози.**

1 столову ложку коренів помістити в емальований посуд, залити 100 мл кип'яченої води кімнатної температури і настоювати 1 годину на водяній бані, процідити. Приймати у теплому вигляді: дорослим та дітям віком від 12 років – по 1 столовій ложці 4–6 разів на день, дітям віком 3–7 років – по 1 десертній ложці 4–6 разів на день, 7–12 років – по 1 столовій ложці 4 рази на день. Приготовлений настій зберігати при температурі 8–15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Діти.** Застосовувати дітям віком від 3 років.

**Передозування.** Нудота, блювання. Лікування: відміна препарату, промивання шлунка.

**Побічні реакції.** Можливі алергічні реакції (у т. ч. шкірні висипи, свербіж). Посилене слизовиділення, подразнення слизової оболонки шлунка.

#### **Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °C.

**Упаковка.** По 40 г або по 60 г, або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецептата.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/ місцезнаходження заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

**Дата останнього перегляду.**

*С.Чечі*

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

*?*

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє

*Пункт узгодження  
07.05.2018 року*