

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2016 № 872
Реєстраційне посвідчення
№ UA/5975/01/01

ЗМІНИ ВНЕСЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
21.09.2021 № 1994

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КРОПУ ПАХУЧОГО ПЛОДИ
(ANETHI GRAVEOLENTIS FRUCTUS)

Склад:

діюча речовина: кропу пахучого плоди;

1 пачка містить: кропу пахучого плоди (*Anethi graveolentis fructus*) 50 г;

1 пачка містить: кропу пахучого плоди (*Anethi graveolentis fructus*) 100 г.

Лікарська форма. Плоди.

Основні фізико-хімічні властивості: окремі напівплодики (мерикарпії), іноді цілісні плоди (вислоплодники) зеленувато-бурого або бурого кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування кислотозалежних захворювань.
Код АТХ А02Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, спазмолітичну, сечогінну і вітрогінну дію; підвищують секрецію шлункових залоз, регулюють моторику кишечника, проявляють відхаркувальні властивості.

Клінічні характеристики.

Показання. Метеоризм; запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано у період вагітності. Підвищує лактацію у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози. 1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15

хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплом вигляді за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років при метеоризмі 2-3 рази на добу по $\frac{1}{5}$ склянки; при захворюваннях верхніх дихальних шляхів 4-5 разів на добу – по $\frac{1}{2}$ -1 столовій ложці. Дітям віком 7-14 років – по 1 десертній ложці, 3-7 років – по 1 чайній ложці, дітям віком від 6 місяців до 3 років – по $\frac{1}{2}$ чайної ложки 4 рази на добу за 15-20 хв до їди. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 6 місяців.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні реакції. Можливі алергічні реакції.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці

Упаковка.

По 50 г, 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.