

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
30.12.2016 № 4429

Реєстраційне посвідчення
№ УА/6114/01/01

І Н С Т Р У К Ц Й
для медичного застосування лікарського засобу

САДІФІТ
(SADIPHYTUM)

Склад:

діючі речовини: 1 г збору містить: топінамбура бульб (*Helianthi tubera*) 0,2 г; стевії листя (*Steviae folia*) 0,2 г; чорниці пагонів (*Vaccini myrtilli cormus*) 0,2 г; квасолі стулок плодів (*Phaseoli valvae fructum*) 0,2 г; чаю зеленого (*Thea chinensis*) 0,15 г; м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*) 0,05 г.

Лікарська форма. Збір.

Основні фізико-хімічні властивості: суміш неоднорідних шматочків зеленого, темно-зеленого, сірувато-зеленого, буровато-зеленого, жовтувато-білого, світло-бурого або буру-коричневого кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовують при діабеті. Код ATX A10 X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини збору чинять гіпоглікемічну дію при цукровому діабеті II типу легкої та середньої тяжкості, що дає можливість у ряді випадків зменшити добові дози пероральних антидіабетичних засобів; регулюють функцію травного тракту, стимулюють активність підшлункової залози, нормалізують обмінні процеси, зменшують рівень холестерину у крові, проявляють протизапальні, жовчогінні та сечогінні властивості.

Клінічні характеристики.

Показання.

Легкі та середні форми цукрового діабету II типу, захворювання травного тракту (ентероколіт, хронічний панкреатит, хронічний холецистит) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Бронхіальна астма, круп; загострення хронічного панкреатиту, загострення хронічного ентероколіту, дискинезії жовчовивідних шляхів; спазмофілія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

У пацієнтів зі шлунково-стравохідним рефлюксом можливе збільшення печії.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Невідома.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 300 мл (1,5 склянки) гарячої кип'ячені води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'ячену водою до 300 мл. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 20-30 днів: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{2}$ склянки, дітям віком 10-14 років – по $\frac{1}{3}\text{-}\frac{1}{4}$ склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 300 мл (1,5 склянки) окропу, закрити і настоювати не менше 1 години. Настоювати рекомендується у термосі. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 20-30 днів: дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{2}$ склянки, дітям віком 10-14 років – по $\frac{1}{3}\text{-}\frac{1}{4}$ склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки.

Через 7-10 діб курс лікування рекомендується повторити (після консультації з лікарем). Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Діти. Препарат застосовувати дітям від 7 років за призначенням лікаря.

Передозування. Недотримання рекомендованих доз може привести до болю у ділянці серця через вміст м'яти перцевої.

Побічні реакції. Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, крапив'янка, контактний дерматит).

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 3,0 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом; по 3,0 г у фільтр-пакеті в індивідуальному пакетику, по 20 фільтр-пакетів у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Генеральний
директор

02.11.2016