

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**15.12.2016 № 906**  
**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/5809/01/01**

**ЗМІНИ ВНЕСЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**  
**28.04.2021 № 832**

**І Н С Т Р У К Ц І Я**  
**для медичного застосування лікарського засобу**  
**ШАВЛІЇ ЛИСТЯ**  
**(SALVIAE FOLIA)**

**Склад:**

*діюча речовина:* шавлії листя (*Salviae folia*);  
1 пачка містить: шавлії листя (*Salviae folia*) 50 г або 60 г;  
1 фільтр-пакет містить: шавлії листя (*Salviae folia*) 1 г.

**Лікарська форма.** Листя.

*Основні фізико-хімічні властивості:* шматочки листя різної форми з домішками стебел і квіток зеленого, сірувато-зеленого або сріблясто-білого кольору з характерним запахом.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для застосування у стоматології. Код АТХ А01А D11.

**Фармакологічні властивості.**

*Фармакодинаміка.*

Біологічно активні речовини листя ущільнюють епітеліальні тканини, знижують проникність клітинних мембран, зміцнюють стінки ушкоджених кровоносних судин. Чинять в'язучу, протизапальну, антисептичну та кровоспинну дію.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Захворювання ротової порожнини (стоматити, гінгівіти, парадонтози) та верхніх дихальних шляхів (ларингіти, фарингіти, трахеїти).

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

**Особливості застосування.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.** За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.** Не впливає.

### **Спосіб застосування та дози.**

1 столову ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскань 3-4 рази на добу: дорослим та дітям віком від 12 років – у нерозведеному вигляді, дітям віком 7-12 років – 4 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води; дітям віком 3-7 років – 2 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води.

5 фільтр-пакетів помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Зовнішньо застосовувати для інгаляцій та полоскань 3-4 рази на добу: дорослим та дітям віком від 12 років – у нерозведеному вигляді, дітям віком 7-12 років – 4 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води; дітям віком 3-7 років – 2 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 2-8 °С не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

**Діти.** Препарат застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

**Передозування.** При передозуванні можливе посилення побічних реакцій.

### **Побічні реакції.**

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.** Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.** По 50 г або по 60 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник/заявник.** ПрАТ «Ліктрави», Україна.

**Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.