

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

07.07.2016 № 685

Реєстраційне посвідчення
№ UA/5675/06/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ЗВІРОБОЮ ТРАВА
(HYPERICI HERBA)

Склад:

діюча речовина: звіробою трава (*Hyperici herba*);
1 пачка містить звіробою трави (*Hyperici herba*) 60 г або 75 г;
1 фільтр-пакет містить звіробою трави (*Hyperici herba*) 1,5 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки стебел, листків, квіток різної форми та недозрілих плодів, зеленувато-жовтого, зеленого, сірувато-зеленого, темно-зеленого, зеленувато-коричневого, яскраво-жовтого або жовтого з чорними крапками, іноді рожево-фіолетового кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на травну систему та метаболізм. Засоби для застосування у стоматології. Код АТХ А01А D11.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять в'язучу, протизапальну і деяку протимікробну дію, що сприяє регенерації тканин; помірно впливають на жовчовиділення, збуджують шлункову секрецію.

Клінічні характеристики.

Показання.

У складі комплексної терапії захворювань жовчовивідних шляхів (дискінезій жовчовивідних шляхів, холециститів); шлунково-кишкового тракту (гострих і хронічних колітів, діареї, метеоризму, гіпоацидного гастриту).

При запальних процесах ротової порожнини (гінгівітах, стоматитах).

Протипоказання.

Індивідуальна гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Артеріальна гіпертензія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не рекомендується застосування хворим, які приймають антикоагулянти, антибіотики, сульфаніламідні, протизапальні, гіпотензивні-блокатори кальцієвих каналів, жіночі статеві гормони, гіпохолестеринемічні засоби (стати́ни), серцеві глікозиди.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказане внутрішнє застосування препарату.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Застосування препарату у деяких пацієнтів може спричинити підвищення артеріального тиску, тому слід бути обережними при керуванні автотранспортом або роботі зі складними механізмами.

Спосіб застосування та дози.

1,5 столової ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв. Процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 16 років – по $\frac{1}{3}$ склянки, дітям віком 12-14 років – по 1-2 столових ложки, дітям віком 15-16 років – по $\frac{1}{4}$ склянки.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настояти 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 16 років – по $\frac{1}{2}$ - 1 склянці, дітям віком 12-14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, діти віком 15-16 років – по $\frac{1}{2}$ - $\frac{1}{4}$ склянки.

Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.

Передозування.

Передозування та тривале застосування спричиняє відчуття гіркоти у роті, неприємні відчуття у ділянці печінки.

Побічні реакції.

Підвищення артеріального тиску; алергічні реакції (гіперемія, висипання, набряк та свербіж шкіри); фотосенсибілізація (під час лікування слід уникати УФ-випромінювання).

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 60 г, 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Виробник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місце знаходження заявника та/або представника заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Заявник погодився
29.04.16 [підпис]