

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
08.11.2017 № 1389

Реєстраційне посвідчення
№ UA/716/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ПИЖМА КВІТКИ
(TANACETI FLORES)

Склад:

діюча речовина: пижма квітки.

Лікарська форма. Квітки.

Основні фізико-хімічні властивості: подрібнена сировина: цілісні квіткові кошики, окремі трубчасті квітки, квітколожа і їх шматочки, шматочки квітконосів; колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений; порошок крупний: суміш шматочків квітколож, квітконосів, цілісних або подрібнених трубчастих квіток; колір жовтий, бурувато-зелений, світло-зелений.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при біліарній патології.
Код ATX A05A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, протимікробну, протиглісну, фітонцидну, в'яжучу та протизапальну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Аскаридоз, гострики; захворювання печінки та жовчовивідних шляхів (холецистити, ангіохоліти); шлунково-кишкові захворювання (гастрити зі зниженою кислотністю, коліти, ентероколіти).

Протипоказання.

Підвищена індивідуальна чутливість до препарату. Гепатити, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою.

Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді за 15 хв до їди: дорослим – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу.

Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді за 15 хв до їди: дорослим – по 2 столові ложки 3-4 рази на добу. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Препарат не застосовувати дітям.

Передозування. Диспептичні розлади, блювання, в тяжких випадках – судоми.

Побічні реакції. Алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °C.

Упаковка. Подрібнена сировина: по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; порошок крупний: по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецептів.



Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/ місцезнаходження заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.

Дата останнього перегляду.

Oleg



*Здекл узгоджено
з матеріалами реєстраційного досьє*