

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
30.05.2016 № 484
Реєстраційне посвідчення
№ UA/5879/01/01

ЗМІНИ ВНЕСЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
04.02.2020 № 296

I H C T R U K C I Я
для медичного застосування лікарського засобу
ПОЛИНУ ГІРКОГО ТРАВА
(ARTEMISIAE ABSINTHII HERBA)

Склад:

діюча речовина: полину гіркого трава (*Artemisiae absinthii herba*);
1 пачка містить: полину гіркого трави (*Artemisiae absinthii herba*) 50 г, або 75 г;
1 фільтр-пакет містить: полину гіркого трави (*Artemisiae absinthii herba*) 1,5 г.

Лікарська форма. Трава.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки листя, стебел, кошиків різної форми сірого, зеленого, жовтого, зеленувато-сірого кольору.

Фармакотерапевтична група. Засоби для підвищення апетиту. Код ATX A15.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату збуджують апетит, стимулюють функцію залоз органів травлення, підвищують секрецію жовчі, панкреатичного і шлункового соків, чинять протизапальну, антисептичну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Для підвищення апетиту і покращення секреторної діяльності органів травлення при гастритах з пониженою секреторною функцією шлунка; у складі комплексної терапії холециститів, дискінезій жовчних шляхів.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Виразка шлунка та двадцятипалої кишki, жовчокам'япа хвороба; наявність в апампезі кровотеч із органів малого таза; анемія; епілепсія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано (препарат підвищує тонус матки).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.



Спосіб застосування та дози.

2 чайні ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченого води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченого водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати настій у теплому вигляді за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Курс лікування – 2-3 тижні. Між курсами обов'язкові перерви до 2 місяців.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 5 років.

Передозування. При тривалому застосуванні можливі аточічні закрепи. Прийом у підвищених дозах, особливо тривалий, може привести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій та спричинити так звану полинну епілепсію. Лікування симптоматичне.

Побічні реакції.

Можливі реакції підвищеної чутливості (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж), нудота, блювання. Прияві побічних реакцій препарат відмінити.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 50 г, або по 75 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецептів.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Дата останнього перегляду.

