

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
07.07.2016 № 685
Реєстраційне посвідчення
№ UA/5855/09/09

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ВІЛЬХИ СУПЛІДДЯ
(ALNI FRUCTUS)

Склад:

діюча речовина: вільхи супліддя (*Alni fructus*);
1 пачка містить вільхи суплідь (*Alni fructus*) 40 г або 100 г;
1 фільтр-пакет містить вільхи суплідь (*Alni fructus*) 2,5 г.

Лікарська форма. Супліддя.

Основні фізико-хімічні властивості:

цільна сировина: яйцеподібні або довгасті супліддя вільхи (шишки) з плодоніжками або без них, лусочки або плоди; колір суплідь і гілочка темно-бурий або темно-коричневий; запах слабкий; смак в'яжучий;
подрібнена сировина: шматочки плодоніжок, лусочки, осей суплідь різної форми і плоди-горішки, від світло-коричневого до темно-коричневого кольору; запах слабкий; смак в'яжучий.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що впливають на травну систему та метаболічні процеси. Код ATХ A16A X.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Біологічно активні речовини суплідь чинять в'яжучу, дезінфікуючу, протизапальну, десенсиблізуючу і кровоспинну дію; сприяють зменшенню бродильних і гнильних процесів при хронічних захворюваннях травного тракту, а також епітелізації слизових оболонок.

Клінічні характеристики.

Показання.

Гострі та хронічні ентерити, ентероколіти, коліти, диспепсії (у комплексному лікуванні).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не встановлена.

Спосіб застосування та дози.

Цільна сировина: 2 столові ложки помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'ячені води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченю водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Подрібнена сировина: 1 столову ложку подрібнених суплідів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'ячені води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 30 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченю водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Фільтр-пакети: 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та підліткам віком від 14 років – по 1 столовій ложці; дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням відвар збовтати.

Приготовлену водну витяжку зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти.

Препарат застосовувати дітям віком від 5 років за призначенням лікаря.

Передозування.

Передозування та тривале застосування викликає прояви гіперчутливості до препарату у вигляді алергічних реакцій.

Побічні реакції.

Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висип, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату.

Термін придатності. 3 роки. Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка. Супліддя по 40 г у пачках; по 100 г у пачках з внутрішнім пакетом; по 2,5 г у фільтр-пакетах, по 20 фільтр-пакетів у пачках або у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє

