

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
19.07.16 № 730
Реєстраційне посвідчення
№ UA/5871/01/01

ЗМІНИ ВНЕСЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
16.08.2018 № 1504

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
МАТИ-Й-МАЧУХИ ЛИСТЯ
(FARFARAЕ FOLIA)

Склад:

діюча речовина: мати-й-мачухи листя (*Farfarae folia*).
1 пачка містить мати-й-мачухи листя (*Farfarae folia*) 100 г.

Лікарська форма. Листя різано-пресоване.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки циліндричної форми, поверхня гладенька, блискуча, рідше матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір темно-зелений з більш світлими вкрапленнями, на торцях світліше

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код ATX R05C A.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, пом'якшувальну, потогінну, спазмолітичну дію; відновлюють активність війчастого епітелію трахеї і бронхів, сприяють розрідженню і відходженню мокротиння, спричиняють обволікачу дію на слизову оболонку порожнини рота та гортані, захищаючи її від подразнення.

Клінічні характеристики.

Показання. Захворювання дихальних шляхів (ларингіти, трахеїти, хронічні бронхіти, бронхопневмонії, бронхіальна астма, бронхоконіктивна хвороба) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування грудю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не впливає.



Спосіб застосування та дози. 1 чайну ложку листя різано-пресованого помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'ячену водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді дорослим та дітям віком від 14 років – по $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ склянки 2-3 рази на добу за 1 годину до їди або по 1 столовій ложці 4-6 разів на добу. Дітям віком 12-14 років – по $\frac{1}{4}$ склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці 2-3 рази на добу за 1 годину до їди. Перед застосуванням настій збовтати. Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °C не більше 2 діб. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні реакції. При гіперчутливості можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

В оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °C у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник. ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Дата останнього перегляду.

