

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
19.08.2012 № 872
Реєстраційне посвідчення
№ UA/5867/01/01

ЗМІНИ ВНЕСЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
04.08.2020 № 1789

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування лікарського засобу
КУКУРУДЗИ СТОВПЧИКИ З ПРИЙМОЧКАМИ
(ZEAЕ МАYDIS STYLI CUM STIGMATIS)

Склад:

діюча речовина: кукурудзи стовпчики з приймочками (*Zea mays styli cum stigmatis*);
1 пачка містить: кукурудзи стовпчиків з приймочками (*Zea mays styli cum stigmatis*) 100 г.

Лікарська форма. Стівпчики з приймочками різано-пресовані.

Основні фізико-хімічні властивості: шматочки циліндричної форми, діаметром від 4 до 6 мм, довжиною 8-12 мм. Поверхня гладенька, блискуча, зрідка матова, мармурова, на торцях нерівна. Колір від світло- до темно-коричневого. Запах слабкий, своєрідний; смак з відчуттям слизистості.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при біліарній патології.
Код АТХ А05А Х.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка.

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, діуретичну (збільшують на 150-160 % відтік сечі), кровоспинну і гіпоглікемічну дію; збільшують секрецію жовчі, зменшують її в'язкість, знижують вміст білірубіну, підвищують вміст протромбіну в крові і прискорюють її згортання, сприяють виведенню з сечею уратів, оксалатів, фосфатів.

Клінічні характеристики.

Показання.

Холецистити, холангіти, гепатити з порушенням жовчовиділення; цистити, сечокам'яна хвороба, набряки; геморагічні діатези, кровотечі, спричинені зниженням рівня протромбіну (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Підвищене згортання крові, збільшений протромбіновий індекс, тромбофлебіт, жовчокам'яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі, обтураційна жовтяниця, анорексія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом іншими механізмами. Не впливає.

Спосіб застосування та дози.

1 десертну ложку стовпчиків з приймочками помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді кожні 3-4 години: дорослим та дітям віком від 14 років – по 1-3 столові ложки, дітям віком 10-14 років – по 1 столовій ложці, 7-10 років – по 1 десертній ложці, 3-7 років – по 1 чайній ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

Приготовлений настій зберігати при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.

Діти. Препарат призначати дітям віком від 3 років.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. почервоніння, висипання, риніт).

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ «Ліктрави», Україна.

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності/місцезнаходження заявника.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.

Дата останнього перегляду.