

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування лікарського засобу

**ІНГАФІТОЛ-1**  
(INHAPHYTOL-1)

**Склад:**

діючі речовини: 1 г збору містить ромашки квіток (*Matricariae flores*) 500 мг, шавлії листя (*Salviae folia*) 500 мг.

**Лікарська форма.** Збір.

**Основні фізико-хімічні властивості:** суміш неоднорідних частинок жовто-сірого кольору з темно-зеленими, жовтими, жовтувато-білими, білими, коричневими, рідко - синьо-фіолетовими і майже чорними вкрапленнями.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що застосовуються при застудних захворюваннях. Код АТХ R05X.

**Фармакологічні властивості.**

Препарат чинить протимікробну і протизапальну дію.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Гострі та хронічні респіраторні захворювання (фарингіт, ларингіт, трахеїт, бронхіт).

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до компонентів препарату. Дитячий вік до 3 років.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не відома.

**Особливості застосування.**

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Не рекомендується у зв'язку з відсутністю спеціальних досліджень.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.**

Не впливає.

**Спосіб застосування та дози.**

Препарат застосовують для інгаляцій та полоскань

2 столові ложки препарату помістити в емальований посуд, залити 200 мл (1 склянкою) гарячої кип'яченої води, закрити кришкою, довести до кипіння на повільному вогні, зняти з вогню і використовувати для інгаляції протягом 5-10 хвилин.

Приготовлений настій процідити, віджати і застосовувати в теплому вигляді для полоскання горла по ½ склянки 3-4 рази на добу.

Доросли та дітям віком від 12 років застосовувати у нерозведеному вигляді; дітям віком 7-12 років – 4 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води; дітям віком 3-7 років – 2 столові ложки настою розвести у 200 мл кип'яченої води.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Приготовлений настій зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 діб.

**Діти.**

Препарат застосовують дітям віком від 3 років за призначенням лікаря.

**Передозування.**

Випадків передозування не зареєстровано.

**Побічні реакції.**

Можливі алергічні реакції (гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

При появі побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Термін придатності.** 1,5 року.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Виробник.**

ПрАТ «Ліктрави».

**Місцезнаходження виробника та адреса місця впровадження його діяльності.**

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, буд. 21.

**Дата останнього перегляду.**



Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доось та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доось та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу

Технік узгодження  
А.П. Д. Дуниненко  
11.09.14

