

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України

25.01.12 № 47

Реєстраційне посвідчення  
№ UA/5670/01/01

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату

**ГРИЦИКІВ ТРАВА**  
(BURSAE PASTORIS HERBA)

**Склад лікарського засобу:**

діюча речовина: грициків трава (Bursae pastoris herba).

Лікарська форма. Трава.

Шматочки листя, стебел, суцвіть, квіток, плодів різної форми світло-зеленого, зеленого, сірувато-зеленого або жовтувато-зеленого кольору з білуватими вкрапленнями.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

**Фармакотерапевтична група.** Препарати, що стимулюють тонус та скорочувальну активність міометрія. Код АТС G02A X.

Біологічно активні речовини рослини виявляють кровоспинну, в'язучу, протизапальну, гіпотензивну, сечогінну та жовчогінну дію; посилюють скорочувальну діяльність гладкої мускулатури матки, активізують моторику шлунка та прискорюють перистальтику кишечника.

**Показання для застосування.**

Атонії матки, маткові кровотечі (у комплексному лікуванні).

**Протипоказання.**

Підвищене згортання крові, тромбоемболія (в анамнезі). Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.*

Протипоказано (підвищує тонус матки).

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не впливає.

**Діти.** Не рекомендується призначати дітям.

**Спосіб застосування та дози.**

2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести

кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді по 1 столовій ложці 4-5 разів на добу після їди.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 15-20 хв. Приймати настій у теплому вигляді по 1 столовій ложці 4-5 разів на добу після їди.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.** Повідомлення відсутні.

**Побічні ефекти.**

Алергічні реакції (у тому числі гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При тривалому застосуванні – зниження артеріального тиску, гіперкоагуляція.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.** Невідома.

**Термін придатності.** 3 роки.

**Умови зберігання.**

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

**Упаковка.**

По 60 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 2 г у фільтр-пакетах № 20 у пачках або у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**ПАСТУШЬЕЙ СУМКИ ТРАВА**  
**(BURSAE PASTORIS HERBA)**

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* пастушьей сумки трава (Bursae pastoris herba).

**Лекарственная форма.** Трава.

Кусочки листьев, стеблей, соцветий, цветков, плодов различной формы светло-зеленого, зеленого, серовато-зеленого или желтовато-зеленого цвета с беловатыми вкраплениями.

**Название и местонахождение производителя.**

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

**Фармакотерапевтическая группа.** Препараты, стимулирующие тонус и сократительную активность миометрия. Код АТС G02A X.

Биологически активные вещества растения оказывают кровоостанавливающее, вяжущее, противовоспалительное, гипотензивное, мочегонное и желчегонное действие; усиливают сократительную деятельность гладкой мускулатуры матки, активизируют моторику желудка и усиливают перистальтику кишечника.

**Показания к применению.**

Атонии матки, маточные кровотечения (в комплексной терапии).

**Противопоказания.**

Повышенная свертываемость крови, тромбозы (в анамнезе). Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

**Особые предостережения.**

*Применение в период беременности или кормления грудью.*

Противопоказано (повышает тонус матки).

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.* Не влияет.

*Дети.* Не рекомендуется назначать детям.

**Способ применения и дозы.**

2 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать к процеженному настою. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде по 1 столовой ложке 4-5 раз в сутки после еды.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15-20 мин. Принимать настой в теплом виде по 1 столовой ложке 4-5 раз в сутки после еды.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

**Передозировка.** Сообщения отсутствуют.

**Побочные эффекты.**

Аллергические реакции (в том числе гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При длительном применении – понижение артериального давления, гиперкоагуляция.

**Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**  
Неизвестно.

**Срок годности.** 3 года.

**Условия хранения.**

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

**Упаковка.**

По 60 г в пачках с внутренним пакетом, по 2 г в фильтр-пакетах № 20 в пачках или в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доосьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу