

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

22 11 11 № 810

Реєстраційне посвідчення
№ UA/5071/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ДЕРЕВІЮ ТРАВА
(MILLEFOLII HERBA)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: деревію трава.

Лікарська форма. Трава.

Шматочки листя, стебел, кошиків та їх частини різної форми; сірувато-зеленого кольору з білими, коричневими, фіолетовими та жовтуватими краплями.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Гемостатичні засоби рослинного походження.

Код АТС В02В Х.

Біологічно активні речовини трави посилюють згортання крові, чинять протизапальну, бактерицидну, антиалергічну дію, виявляють спазмолітичний ефект щодо гладеньких м'язів кишечника, сечовивідних і жовчовивідних шляхів.

Показання для застосування. Легеневі, кишкові, гемороїдальні, носові, маткові (при запальних процесах, фіброміомах) кровотечі, гіпоацидний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки, виразкові спастичні коліти, метеоризм, захворювання печінки та жовчовивідних шляхів (гепатити, холецистити, ангіохоліти), захворювання нирок та сечового міхура (цистити, уретрити, гломерулонефрити, пієлонефрити) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до інших рослин родини Айстрових (Складноцвіті).

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано (підвищує тонус матки).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не встановлена.

Діти. Препарат застосовують дітям старше 12 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

1,5 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настояти на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1/3-1/2 склянки, дітям віком 12-14 років – по 1/4 склянки.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настояти 15-20 хв. Приймати у теплом вигляді 2-3 рази на добу за 30 хв. до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 100 мл, дітям віком 12-14 років – по 50 мл. Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Можливі алергічні реакції (гіперемія, висипання), запаморочення, нудота.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
22.11.11 № 810
Регистрационное удостоверение
№ УА/5671/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВА
(MILLEFOLH HERBA)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: тысячелистника трава.

Лекарственная форма. Трава.

Кусочки листьев, стеблей, корзинок и их частей различной формы; серовато-зеленого цвета с белыми, коричневыми, фиолетовыми и желтоватыми вкраплениями.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Гемостатические средства растительного происхождения.
Код АТС В02В Х.

Биологически активные вещества травы усиливают свертываемость крови, оказывают противовоспалительное, бактерицидное, антиаллергическое действие, спазмолитический эффект относительно гладкой мускулатуры кишечника, мочевыводящих и желчевыводящих путей.

Показания к применению.

Легочные, кишечные, геморроидальные, носовые, маточные (при воспалительных процессах, фибромиомах), кровотечения; гипоацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвенные спастические колиты, метеоризм, заболевания печени и желчевыводящих путей (гепатиты, холециститы, ангиохолиты), заболевания почек и мочевого пузыря (циститы, уретриты, гломерулонефриты, пиелонефриты) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания.

Повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата и другим растениям семейства Астровых (Сложноцветных).

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Противопоказано (повышает тонус матки).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не установлена.

Дети. Препарат применяют детям старше 12 лет по назначению врача.

Способ применения и дозы.

1,5 столовые ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде 2-3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/3-1/2 стакана, детям 12-14 лет – по 1/4 стакана.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15-20 мин. Принимать в теплом виде 2-3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 100 мл, детям 12-14 лет – по 50 мл.

Перед применением настоев взболтать.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка.

Возможны аллергические реакции (гиперемия, сыпь), головокружение, тошнота.

Побочные реакции.

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций нужно прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Неизвестно.

Срок годности. 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 50 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу