

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

03.02.12 № 82
Ресстраційне посвідчення
№ UA/5862/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ЖОВЧОГІННИЙ ЗБІР № 2
(CHOLAGOGAE SPECIES № 2)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г збору містить: цмину піщаного квіток 0,4 г, деревію трави 0,2 г, м'яти перцевої листя 0,2 г, коріандру плодів 0,2 г.

Лікарська форма. Збір.

Суміш неоднорідних шматочків сірувато-зеленого кольору з вкрапленнями жовтого, оранжевого і жовтувато-бурого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Жовчогінні засоби. Код АТС А05А Х.

Біологічно активні речовини препарату збільшують секрецію жовчі, чинять жовчогінну, спазмолітичну, протизапальну дії.

Показання для застосування.

Хронічні холецистити, холангіти, ангіохоліти з гіпомоторною дискінезією жовчного міхура (у складі комплексної терапії).

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату (у т.ч. до рослин родини Айстрових (Складноцвіті). Обтураційна жовтяниця або жовчокам'яна хвороба з наявністю конкрементів розміром більше 10 мм у діаметрі; гострі запальні захворювання печінки, жовчного міхура та нідшлункової залози; бронхіальна астма; підвищене згортання крові, схильність до тромбоутворення.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

З обережністю застосовувати хворим зі шлунково-стравохідним рефлюксом, печією.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям від 3 років.

Спосіб застосування та дози.

2 десертні ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/2-1/3 склянки, дітям 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/2-1/3 склянки, дітям 12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Можливе запаморочення, нудота, підвищення артеріального тиску, біль у ділянці серця.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідомо.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 2 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
03.02.12 № 82
Регистрационное удостоверение
№ UA/5862/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ЖЕЛЧЕГОННЫЙ СБОР № 2
(CHOLAGOGAE SPECIES № 2)

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1 г сбора содержит: бессмертника песчаного цветков 0,4 г, тысячелистника травы 0,2 г, мяты перечной листьев 0,2 г, кориандра плодов 0,2 г.

Лекарственная форма. Сбор.

Смесь неоднородных кусочков серовато-зеленого цвета с включениями желтого, оранжевого и желтовато-бурого цвета.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Желчегонные средства. Код АТС А05А Х.

Биологически активные вещества препарата увеличивают секрецию желчи, оказывают желчегонное, спазмолитическое, противовоспалительное действие.

Показания к применению.

Хронические холециститы, холангиты, ангиохолиты с гипомоторной дискинезией желчного пузыря (в составе комплексной терапии).

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата (в т.ч. к растениям семейства Астровых (Сложноцветные). Обтурационная желтуха или желчекаменная болезнь с наличием конкрементов размером больше 10 мм в диаметре; острые воспалительные заболевания печени, желчного пузыря и поджелудочной железы; бронхиальная астма; повышенная свертываемость крови, склонность к тромбообразованию.

Надлежащие меры безопасности при применении.

С осторожностью применять больным с желудочно-пищеводным рефлюксом, изжогой.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат применяют детям от 3 лет.

Способ применения и дозы.

2 десертные ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям от 14 лет – по 1/2-1/3 стакана, детям 12-14 лет – по 1/4 стакана, 7-12 лет – по 2 столовые ложки, 3-7 лет – по 1 столовой ложке. Перед применением настоек взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям от 14 лет – по 1/2-1/3 стакана, детям 12-14 лет – по 1/4 стакана, 7-12 лет – по 2 столовые ложки, 3-7 лет – по 1 столовой ложке.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка.

Возможно головокружение, тошнота, повышение артериального давления, боль в области сердца.

Побочные эффекты.

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит). При появлении побочных реакций нужно прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 2 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 50 г в пачках с внутренним пакетом, по 2 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доось та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу