

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЗАСПОКІЙЛИВИЙ ЗБІР № 2 (СЕДАТИВНИЙ)
(SEDATIVAE SPECIES № 2)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г збору містить: пустирника трави 400 мг, хмелю шишок 200 мг, м'яти перцевої листя 150 мг, валеріани кореневищ з коренями 150 мг, солодки коренів 100 мг.

Лікарська форма. Збір.

Суміш неоднорідних шматочків сіро-зеленого кольору з світло-жовтими, жовтими, світло-коричневими, сірувато-бурими і бурими включеннями.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M.

Біологічно активні речовини препарату чинять седативну, спазмолітичну дію, зменшують збудливість центральної нервової системи.

Показання для застосування.

Безсоння, нейроциркуляторна дистонія, підвищена збудливість, неврастенія – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Депресія та захворювання, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи; порушення функції печінки та нирок; бронхіальна астма, гіпокаліємія, тяжкий ступінь ожиріння.

Особливості застосування.

З обережністю застосовують хворим з шлунково-стравохідним рефлюксом, печією, міокардитом, перикардитом, інфарктом міокарда, брадикардією.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. За призначенням лікаря, якщо користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

З обережністю застосовувати особам, які керують транспортом або механічними засобами.

Діти. Препарат застосовують дітям від 5 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою доводять кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20-30 хв до їди: дорослим і дітям від 14 років – по 1/3 склянки, дітям 10-14 років – по 1/4 склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки, 5-7 років – по 1 десертній-1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20-30 хв до їди: дорослим і дітям від 14 років – по 1 склянці, дітям 10-14 років – по 1/2 склянки, 7-10 років – по 1/3 склянки, 5-7 років – по 2 столових ложки.

Курс лікування становить 2-4 тижні.

Передозування.

При передозуванні можливі порушення водно-електролітного балансу, підвищена втомлюваність, сонливість, запаморочення, що потребує відміни препарату. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит), пригнічення емоційних реакцій, сонливість, головний біль, запаморочення, відчуття слабкості, зниження розумової та фізичної працездатності, гіпокаліємія.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Настій можна поєднувати з іншими заспокійливими та серцево-судинними засобами. Може посилити гіпокаліємію одночасне застосування разом із серцевими глікозидами, антиаритмічними препаратами (хінідин), тіазидними та петльовими діуретиками, проносними засобами. Посилює дію снодійних, анальгетичних, антигіпертензивних препаратів, серцевих глікозидів та алкоголю.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 60 г, 75 г у пачках із внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 в пачці або в пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
УСПОКОИТЕЛЬНЫЙ СБОР № 2 (СЕДАТИВНЫЙ)
(SEDATIVAE SPECIES № 2)

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1 г сбора содержит: пустырника травы 400 мг, хмеля шишек 200 мг, мяты перечной листьев 150 мг, валерианы корневищ с корнями 150 мг, солодки корней 100 мг.

Лекарственная форма. Сбор.

Смесь неоднородных кусочков серо-зеленого цвета со светло-желтыми, желтыми, светло-коричневыми, серовато-бурыми и бурыми включениями.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Снотворные и седативные средства. Код АТС N05C M.

Биологически активные вещества препарата оказывают седативное, спазмолитическое действие, уменьшают возбудимость центральной нервной системы.

Показания к применению.

Бессонница, нейроциркуляторная дистония, повышенная возбудимость, неврастения – в составе комплексной терапии.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Депрессия и заболевания, сопровождающиеся угнетением деятельности центральной нервной системы; нарушение функции печени и почек; бронхиальная астма, гипокалиемия, тяжелая степень ожирения.

Особенности применения.

С осторожностью применять больным с желудочно-пищеводным рефлюксом, изжогой, миокардитом, перикардитом, инфарктом миокарда, брадикардией.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

По назначению врача, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

С осторожностью применять лицам, управляющим транспортом или механическими средствами.

Дети. Препарат применяют детям от 5 лет по назначению врача.

Способ применения и дозы.

2 столовые ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 2 раза в сутки за 20-30 мин до еды: взрослым и детям от 14 лет – по 1/3 стакана, детям 10-14 лет – по 1/4 стакана, 7-10 лет – по 2 столовые ложки, 5-7 лет – по 1 десертной-1 столовой ложке. Перед применением настоев взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивают 15 мин. Применять в теплом виде 2 раза в сутки за 20-30 мин до еды: взрослым и детям от 14 лет – по 1 стакану, детям 10-14 лет – по 1/2 стакана, 7-10 лет по – 1/3 стакана, 5-7 лет – по 2 столовые ложки.

Курс лечения составляет 2-4 недели.

Передозировка.

При передозировке возможны нарушение водно-электролитного баланса, повышенная утомляемость, сонливость, головокружение, что требует отмены препарата. Лечение симптоматическое.

Побочные эффекты.

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит), угнетение эмоциональных реакций, сонливость, головная боль, головокружение, ощущение слабости, снижение умственной и физической работоспособности, гипокалиемия.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Настой можно сочетать с другими успокоительными и сердечно-сосудистыми средствами. Может усилить гипокалиемию одновременное применение с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), тиазидными и петлевыми диуретиками, слабительными средствами. Усиливает действие снотворных, анальгетических, антигипертензивных препаратов, сердечных гликозидов и алкоголя.

Срок годности. 2 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 60 г, 75 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу