

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

УКРОПА ПАХУЧЕГО ПЛОДЫ
(ANETHI GRAVEOLENTIS FRUCTUS)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: укропа пахучего плоды.

Лекарственная форма. Плоды.

Отдельные полуплодики (мерикарпии), реже цельные плоды (вислоплодники) зеленовато-бурого или бурого цвета.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Антацидные, противоязвенные и ветрогонные средства.
Код АТС А02Х.

Биологически активные компоненты плодов оказывают желчегонное, спазмолитическое, диуретическое и ветрогонное действие; повышают секрецию пищеварительных желез, регулируют моторику кишечника, проявляют отхаркивающие свойства.

Показания к применению.

Метеоризм; воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Противопоказано в период беременности. Повышает лактацию в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат применяют детям от 6 месяцев.

Способ применения и дозы.

1 столовую ложку плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре на протяжении 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде за 15-20 мин до еды взрослым и детям старше 14 лет при метеоризме 2-3 раза в сутки по 1/5 стакана; при заболеваниях верхних дыхательных путей – 4-5 раз в сутки по 1/2-1 столовой ложке. Детям 7-14 лет – по 1 десертной ложке, 3-7 лет –

по 1 чайной ложке, детям от 6 месяцев до 3 лет – по 1/2 чайной ложки 4 раза в сутки за 15-20 мин до еды. Перед применением настой взболтать.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

23.08.12 № 127

Реєстраційне посвідчення
№ *UA/5945/01/01*

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
КРОПУ ПАХУЧОГО ПЛОДИ
(ANETHI GRAVEOLENTIS FRUCTUS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: кропу пахучого плоди.

Лікарська форма. Плоди.

Окремі напівплодики (мерикарпії), іноді цілісні плоди (вислоплодники) зеленувато-бурого або бурого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Антацидні, противиразкові і вітрогінні засоби.

Код АТС А02Х.

Біологічно активні речовини препарату чинять жовчогінну, спазмолітичну, сечогінну і вітрогінну дію; підвищують секрецію шлункових залоз, регулюють моторику кишечника, проявляють відхаркувальні властивості.

Показання для застосування.

Метеоризм; запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано у період вагітності. Підвищує лактацію у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям від 6 місяців.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді за 15-20 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років при метеоризмі 2-3 рази на добу по 1/5 склянки; при захворюваннях верхніх дихальних шляхів 4-5 разів на добу – по 1/2-1 столовій ложці. Дітям віком 7-14 років – по 1 десертній ложці,

3-7 років – по 1 чайній ложці, дітям від 6 місяців до 3 років – по 1/2 чайної ложки 4 рази на добу за 15-20 хв до їди. Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу