

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
07.03.13 № 190
Регистрационное удостоверение
№ 118/1579/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ЛАМИНАРИИ СЛОЕВИЦА (МОРСКАЯ КАПУСТА)
(LAMINARIAE THALLI)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: ламинарии слоевища.

Лекарственная форма. Слоевища.

Кусочки слоевищ различной формы. Цвет от светло-оливкового до темно-оливкового, зеленовато-коричневый, красновато-коричневый, темно-серый с зеленоватым оттенком, зеленовато-черный.

Название и местонахождение производителя.

ЧАО «Лектравы».

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.

Фармакотерапевтическая группа. Слабительные средства. Код АТС А06А С.

Биологически активные вещества препарата оказывают противовоспалительное, мочегонное, общеукрепляющее, противосклеротическое, гипогликемическое действие, активно влияют на функцию щитовидной железы, регулируют обмен веществ, способствуют опорожнению кишечника, способствуют выведению радионуклидов из организма.

Показания к применению. Хронические атонические запоры; хронические энтероколиты, проктиты - в составе комплексной терапии; легкие формы диффузного токсического зоба (базедовой болезни) - в составе комплексной терапии; профилактика эндемического зоба, атеросклероза; как дополнительное средство при гипертиреозе.

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или к препаратам йода. Повышенная чувствительность к морской капусте. Склонность к кровотечениям, нефриты, геморрагические диатезы, фурункулез, туберкулез легких.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Опыт применения препарата в лечении детей отсутствует.

Способ применения и дозы. Взрослые применяют по 1/2-1 чайной ложке морской капусты утром или вечером, запивая 1/3-1/2 стакана воды.

При дисфункции щитовидной железы курс лечения составляет 15-30 дней, в других случаях длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты. Реакции гиперчувствительности. При длительном применении и повышенной чувствительности к йоду возможны явления йодизма (насморк, слезотечение, гиперсаливация). При появлении побочных реакций необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Не установлено.

Срок годности. 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

Упаковка.

По 75 г, или по 100 г, или по 150 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска.

Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

07.03.13 № 190

Реєстраційне посвідчення
№ МА/7579/04/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛАМІНАРІЇ СЛАНІ (МОРСЬКА КАПУСТА)
(LAMINARIAE THALLI)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: ламінарії слані.

Лікарська форма. Слані.

Шматочки сланей різної форми. Колір від світло-оливкового до темно-оливкового, зеленкувато-коричневий, червонувато-коричневий, темно-сірий із зеленкуватим відтінком, зеленкувато-чорний.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Фармакотерапевтична група. Проносні засоби. Код АТС А06А С.

Біологічно активні речовини препарату чинять протизапальну, сечогінну, загальнозміцнювальну, протисклеротичну, гіпоглікемічну дію, активно впливають на функцію щитовидної залози, регулюють обмін речовин, сприяють випороженню кишечника, сприяють виведенню радіонуклідів з організму.

Показання для застосування. Хронічні атонічні запори; хронічні ентероколіти, проктити - у складі комплексної терапії; легкі форми дифузного токсичного зобу (базедової хвороби) - у складі комплексної терапії; профілактика ендемічного зобу, атеросклерозу; як додатковий засіб при гіпертиреозі.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до препаратів йоду. Підвищена чутливість до морської капусти. Схильність до кровотечі, нефрити, геморагічні діатези, фурункульоз, туберкульоз легень.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не встановлена.

Діти. Досвід застосування препарату дітям відсутній.

Спосіб застосування та дози. Дорослим застосовувати по 1/2-1 чайній ложці морської капусти вранці або ввечері, запиваючи 1/3-1/2 склянки води.

При дисфункції щитовидної залози курс лікування становить 15-30 днів, в інших випадках тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти. Реакції гіперчутливості. При тривалому застосуванні і підвищеній чутливості до йоду можливі прояви йодизму (нежить, слезотеча, гіперсалівація). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Не встановлена.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

В оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

Упаковка.

По 75 г, або по 100 г, або по 150 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску.

Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу