

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

23.02.12 № 124

Реєстраційне посвідчення
№ UA/5944/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ЛИПИ КВІТКИ
(TILIAE FLORES)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: липи квітки.

Лікарська форма. Квітки.

Шматочки квіток, квітконіжок і приквітків різної форми; жовтаво-білого, зеленувато- або жовтаво-сірого, світло-жовтого, жовтаво-зеленого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Антисептичні засоби. Код АТС R02A A20.

Біологічно активні речовини препарату чинять протизапальну, антисептичну, потогінну, жовчогінну, м'яку седативну дію, посилюють секрецію шлункового соку.

Показання для застосування.

Внутрішньо – при застудних захворюваннях, бронхітах, зовнішньо – при ангінах, стоматитах, ларингітах, гінгівітах (у складі комплексної терапії).

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Поліноз.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям старше 3 років.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки квіток помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком старше 14 років – по 1/2-1 склянці, дітям віком 12-14 років – по 1/3 склянки, 7-12 років – по 1/4 склянки, 3-7 років – по 2 столові ложки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3-4 рази на добу. Перед застосуванням настій збовтати.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2-3 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком старше 14 років – по 1 склянці, дітям віком 12-14 років – по 1/2 склянки, 7-12 років – по 1/3 склянки, 3-7 років – по 1/4 склянки. Зовнішньо застосовувати для полоскання ротової порожнини і горла 3-4 рази на добу.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти.

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри). При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доось та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
23.02.12 № 127
Регистрационное удостоверение
№ *UA/5947/01/01*

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ЛИПЫ ЦВЕТКИ
(TILIAE FLORES)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: липы цветки.

Лекарственная форма. Цветки.

Кусочки цветков, цветоножек и прицветников различной формы; желтовато-белого, зеленовато- или желтовато-серого, светло-желтого, желтовато-зеленого цвета.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Антисептические средства. Код АТС R02A A20.

Биологически активные вещества препарата оказывают противовоспалительное, антисептическое, потогонное, желчегонное, мягкое седативное действие, усиливают секрецию желудочного сока.

Показания к применению.

Внутрь – при простудных заболеваниях, бронхитах, наружно – при ангинах, стоматитах, ларингитах, гингивитах (в составе комплексной терапии).

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Поллиноз.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

По назначению врача в том случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат применяют детям старше 3 лет.

Способ применения и дозы.

2 столовых ложки цветков поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде 2-3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/2-1 стакану, детям 12-14 лет – по 1/3 стакана, 7-12 лет – по 1/4 стакана, 3-7 лет – по 2 столовые ложки. Наружно применяют для полосканий полости рта и горла 3-4 раза в сутки. Перед применением настой взболтать.

3 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2-3 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1 стакану, детям 12-14 лет – по 1/2 стакана, 7-12 лет – по 1/3 стакана, 3-7 лет – по 1/4 стакана. Наружно применяют для полоскания полости рта и горла 3-4 раза в сутки.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты.

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи). При появлении побочных реакций необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Неизвестно.

Срок годности. 2 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 50 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного дес'я та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу