

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства охорони**  
**здоров'я України**

*03.08.12 № 82*

**Реєстраційне посвідчення**  
**№ UA/5948/01/01**

**ІНСТРУКЦІЯ**  
**для медичного застосування препарату**  
**ЛЬОНУ НАСІННЯ**  
**(LINI SEMINA)**

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* льону насіння.

**Лікарська форма.** Насіння.

Насіння сплюснуте, яйцеподібної форми, загострене з одного кінця і округле з іншого, нерівнобоке; поверхня насіння гладенька, блискуча; колір від світло-жовтого до темно-коричневого.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

**Фармакотерапевтична група.** Засоби для лікування кислотозалежних захворювань.

Код АТС А02Х.

Біологічно активні речовини препарату чинять обволікаючу, протизапальну і легку проносну дію, вкриваючи тонким шаром слизові оболонки травного тракту та запобігаючи їх подразненню.

**Показання для застосування.**

У складі комплексної терапії захворювань слизових оболонок травного тракту (ентерити, коліти, езофагіти, виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки), запальних процесів шкіри (фурункулез, абсцеси).

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гострий та хронічний холецистит у стадії загострення; непрохідність кишечника.

**Особливі застереження.**

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Застосовують дітям від 3 років за призначенням лікаря.

**Спосіб застосування та дози.**

1 чайну ложку насіння залити 100 мл окропу і збовтувати протягом 15 хв, процідити. Внутрішньо застосовувати тільки свіжоприготований препарат у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди: дорослим та дітям від 14 років – по 1/4 склянки, дітям 12-14 років – по 2 столові ложки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

Зовнішньо застосовувати сухе нагріте насіння в полотняних мішечках або свіжоперемелене, запарене у невеликій кількості окропу у вигляді припарок при фурункулах та абсцесах для прискорення їх дозрівання.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.**

При передозуванні можлива діарея.

**Побічні ефекти.**

Можливі алергічні реакції, при тривалому застосуванні – діарея та больовий синдром. При виникненні побічних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома.

**Термін придатності. 3 роки.**

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С.

**Упаковка.**

По 100 г у пачках з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску. Без рецепта.****Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доосьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу

**ИНСТРУКЦИЯ**  
по медицинскому применению препарата

**ЛЬНА СЕМЕНА**  
(LINI SEMINA)

**Состав лекарственного средства:**  
*действующее вещество:* льна семена.

**Лекарственная форма.** Семена.

Семена сплюснутые, яйцевидной формы, заостренные с одного конца и округлые с другого, неравнобокие; поверхность семян гладкая, блестящая; цвет от светло-желтого до темно-коричневого.

**Название и местонахождение производителя.**

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

**Фармакотерапевтическая группа.** Средства для лечения кислотнозависимых заболеваний.  
Код АТС А02Х.

Биологически активные вещества препарата оказывают обволакивающее, противовоспалительное и легкое слабительное действие, покрывая тонким слоем слизистые оболочки пищеварительного тракта и предохраняя их от раздражения.

**Показания к применению.**

В составе комплексной терапии заболеваний слизистых оболочек пищеварительного тракта (энтериты, колиты, эзофагиты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), воспалительных процессов кожи (фурункулез, абсцессы).

**Противопоказания.**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Острый и хронический холецистит в стадии обострения; непроходимость кишечника.

**Особые предостережения.**

**Применение в период беременности или кормления грудью.**

По назначению врача в том случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.** Не влияет.

**Дети.** Препарат применяют детям от 3 лет по назначению врача.

**Способ применения и дозы.**

1 чайную ложку семян залить 100 мл кипятка и взбалтывать в течение 15 мин, процедить. Внутрь принимать только свежеприготовленный препарат в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды: взрослым и детям от 14 лет – по 1/4 стакана, детям 12-14 лет – по 2 столовые ложки, 7-12 лет – по 1 столовой ложке, 3-7 лет – по 1 десертной ложке. Наружно применять сухие нагретые семена в полотняных мешочках или свежемельченые запаренные в небольшом количестве кипятка в виде припарок при фурункулах и абсцессах для ускорения их созревания. Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

**Передозировка.**

При передозировке возможна диарея.

**Побочные эффекты.**

Возможны аллергические реакции, при длительном применении – диарея и рвотный синдром. При возникновении побочных реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Неизвестно.

**Срок годности.** 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.**

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С.

**Упаковка.**

По 100 г в пачках с внутренним пакетом.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.**

Утверждено с материалами  
регистрационного досье та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу