

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЛИСТЬЯ
(FARFARAE FOLIA)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: мать-и-мачехи листья.

Лекарственная форма. Листья.

Кусочки листьев различной формы серовато-зеленого цвета.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающие средства. Код АТС R05C A.

Биологически активные вещества препарата оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, смягчительное, потогонное, спазмолитическое действие; восстанавливают активность реснитчатого эпителия трахеи и бронхов, способствуют разжижению и отхождению мокроты, оказывают обволакивающее действие на слизистую оболочку полости рта и гортани, защищая их от раздражения.

Показания к применению. Заболевания дыхательных путей (ларингиты, трахеиты, хронические бронхиты, бронхопневмонии, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

По назначению врача в том случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Препарат применяют детям старше 3 лет по назначению врача.

Способ применения и дозы. 2 десертные ложки листьев поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым и детям старше 14 лет принимать в теплом виде по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в сутки за 1 час до еды или по 1 столовой ложке 4-6 раз в сутки. Детям в возрасте 12-14 лет –

по 1/4 стакана, 7-12 лет – по 2 столовые ложки, 3-7 лет – по 1 столовой ложке 2-3 раза в сутки за 1 час до еды. Перед применением настой взболтать.
Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты. При гиперчувствительности возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отёк кожи).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 40 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доось та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

03.02.12 № 82

Реєстраційне посвідчення/
№ UA/5892/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
МАТИ-Й-МАЧУХИ ЛИСТЯ
(FARFARAE FOLIA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: мати-й-мачухи листя.

Лікарська форма. Листя.

Шматочки листя різної форми сірувато-зеленого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A.

Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, пом'якшувальну, потогінну, спазмолітичну дію; відновлюють активність в'їчастого епітелію трахеї і бронхів, сприяють розрідженню і відходженню мокротиння, спричиняють обволікаючу дію на слизову оболонку порожнини рота та гортані, захищаючи її від подразнення.

Показання для застосування. Захворювання дихальних шляхів (ларингіти, трахеїти, хронічні бронхіти, бронхопневмонії, бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат застосовують дітям старше 3 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози. 2 десертні ложки листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплом вигляді дорослим та дітям старше 14 років – по 1/3-1/2 склянки 2-3 рази на добу за 1 годину до їди або по 1 столовій ложці 4-6 разів на добу. Дітям віком

12-14 років – по 1/4 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці 2-3 рази на добу за 1 годину до їди. Перед застосуванням настій збовтати.
Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти. При гіперчутливості можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не засосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 40 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу