

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины

23.09.13 № 826

Регистрационное удостоверение
№ UA/8919/04/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

МЕЛИССЫ ТРАВА
(MELISSAE HERBA)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: мелиссы трава.

Лекарственная форма. Трава.

Измельченное сырье. Кусочки стеблей, листьев с кусочками цветков, отдельными цветками или без них. Цвет стеблей – зеленый, листьев – от светло- или серо-зеленого до темно-зеленого, венчика – желтоватый, белый или бледно-лиловый.

Порошок крупный. Кусочки стеблей, листьев с кусочками цветков или без них, от светло- или серо-зеленого до темно-зеленого цвета с желтоватыми, белыми или бледно-лиловыми вкраплениями или без них.

Название и местонахождение производителя.

ЧАО «Лектравы».

Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, дом 21.

Фармакотерапевтическая группа. Снотворные и седативные средства. Код АТС N05C M.

Показания к применению. В составе комплексного лечения состояний общего нервного возбуждения (повышенная эмоциональная активность, возбудимость, раздражительность), бессонницы, вегетососудистой дистонии, изменений артериального давления вследствие стресса.

Противопоказания. Гиперчувствительность к препарату. Артериальная гипотензия.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Информация об опыте применения препарата в период беременности или кормления грудью отсутствует.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. С осторожностью применять лицам, управляющим автотранспортом и работающим с другими механизмами.

Дети. Препарат применять детям с 3 лет.

Способ применения и дозы. Перед началом лечения следует посоветоваться с врачом.

1 столовую ложку травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и выдержать на кипящей водяной бане 15 минут. Настоять при комнатной температуре 45 минут, процедить, остаток отжать к процеженному настою. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать в теплом виде по 1/3 стакана 3 раза в сутки за 15-20 мин до еды. Детям в возрасте 3-5 лет – по 1 чайной ложке, 5-7 лет – по 1 десертной ложке, 7-12 лет – по 1 столовой ложке, 12-14 лет – по 2 столовые ложки, с 14 лет – по 1/4 стакана 3 раза в сутки за 15-20 мин до еды. Перед употреблением настоя рекомендуется взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 минут. Взрослым принимать в теплом виде – по 1/2 стакана 3-4 раза в сутки за 15-20 мин до еды. Детям в возрасте 3-5 лет – по 1 десертной ложке, 5-7 лет – по 1 столовой ложке, 7-12 лет – по 2 столовые ложки, 12-14 лет – по 1/4 стакана, с 14 лет – по 1/3 стакана 3 раза в сутки за 15 – 20 мин до еды.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2-8 °С) не более 2 суток.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. При передозировке возможны головокружение, вялость, снижение концентрации внимания. Лечение: прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, сыпь, зуд и отек кожи). При появлении побочных реакций прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. При одновременном применении возможно усиление действия других седативных и снотворных средств.

При необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Срок годности. 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения. При температуре не выше 30 °С.

Упаковка.

Измельченное сырье: по 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Порошок крупный: по 1,5 г в фильтр-пакетах № 20.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

23.09.13 № 826

Ресстраційне посвідчення

№ UA/8919/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

МЕЛІСИ ТРАВА
(MELISSAE HERBA)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: меліси трава.

Лікарська форма. Трава.

Подрібнена сировина. Шматочки стебел, листя зі шматочками квіток, окремими квітками або без них. Колір стебел – зелений, листя – від світло- або сіро-зеленого до темно-зеленого, віночка – жовтуватий, білий або блідо-ліловий.

Порошок крупний. Шматочки стебел, листя зі шматочками квіток або без них, від світло- або сіро-зеленого до темно-зеленого кольору з жовтуватими, білими або блідо-ліловими краплями або без них.

Назва і місцезнаходження виробника.

ПрАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Фармакотерапевтична група. Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M.

Показання для застосування. У складі комплексного лікування станів загального нервового збудження (підвищена емоційна активність, збудливість, дратівливість), безсоння, вегетосудинної дистонії, змін артеріального тиску внаслідок стресу.

Протипоказання. Гіперчутливість до препарату. Артеріальна гіпотензія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. З обережністю застосовувати особам, які керують автотранспортом та працюють з іншими механізмами.

Діти. Препарат застосовувати дітям віком від 3 років.

Спосіб застосування та дози. Перед початком лікування слід порадитися з лікарем.

1 столову ложку трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і тримати на киплячій водяній бані 15 хв. Настоявати при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по 1/3 склянки 3 рази на добу за 15-20 хв до їди. Дітям віком 3-5 років – по 1 чайній ложці, 5-7 років – по 1 десертній ложці, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 12-14 років – по 2 столові ложки, від 14 років – по 1/4 склянки 3 рази на добу за 15-20 хв до їди. Перед застосуванням настій рекомендується збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоявати 15 хв. Дорослим приймати у теплому вигляді – по 1/2 склянки 3-4 рази на добу за 15-20 хв до їди. Дітям віком 3-5 років – по 1 десертній ложці, 5-7 років – по 1 столовій ложці, 7-12 років – по 2 столові ложки, 12-14 років – по 1/4 склянки, від 14 років – по 1/3 склянки 3 рази на день за 15-20 хв до їди.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 діб.

Тривалість лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. При передозуванні можливі запаморочення, в'ялість, зниження концентрації уваги. Лікування: припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції (у т. ч. гіперемія, висипання, свербіж та набряк шкіри). При появі побічних реакцій припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. При одночасному застосуванні можливе посилення дії інших седативних та снодійних засобів. У разі необхідності одночасного застосування будь-яких інших лікарських засобів слід проконсультуватися з лікарем.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

При температурі не вище 30 °С.

Упаковка.

Подрібнена сировина: по 50 г у пачках із внутрішнім пакетом.

Порошок крупний: по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу