

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
15.12.11. № 905

Регістраційне посвідчення
№ UA/5874/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
НИРКОВИЙ ЧАЙ
(ORTHOSIPHONIS STAMINEI FOLIA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: ортосифону тичинкового листя.

Лікарська форма. Листя.

Шматочки листя і стебел різної форми, зеленого, сірувато-зеленого, зеленувато-коричневого, фіолетово-бурого або фіолетово-коричневого кольору з жовтувато-білими краплями.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Рослинні засоби з діуретичним ефектом. Код АТС С03В Х.

Біологічно активні речовини листя чинять діуретичну, спазмолітичну і жовчогінну дію; підвищують секрецію шлункового соку, збільшують у ньому вміст вільної соляної кислоти, виводять з організму сечовину, сечову кислоту, хлориди.

Показання для застосування. Гострі та хронічні захворювання нирок, холецистити; набряки, спричинені порушеною функцією нирок або серцевою недостатністю (у складі комплексної терапії).

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату; гіперацидний гастрит, виразкова хвороба.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

За рекомендацією лікаря, коли користь від застосування для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат не призначають дітям віком до 3 років.

Спосіб застосування та дози.

1 десертну ложку листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20-30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1/2 склянки; дітям віком 12-14 років – по 1/3 склянки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

При холециститах застосовувати після їди. Перед прийомом настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді 2 рази на добу за 20-30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1/2 склянки; дітям віком 12-14 років – по 1/3 склянки, 7-12 років – по 1 столовій ложці, 3-7 років – по 1 десертній ложці.

При холециститах застосовувати після їди.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. При передозуванні можливий біль у ділянці нирок, печінки, шлунка.

Побічні ефекти. Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 4 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доось та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
15.12.11 № 905
Регистрационное удостоверение
№ УА/5874/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПОЧЕЧНЫЙ ЧАЙ
(ORTHOSIPHONIS STAMINEI FOLIA)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: ортосифона тычиночного листья.

Лекарственная форма. Листья.

Кусочки листьев и стеблей различной формы зеленого, серовато-зеленого, зеленовато-коричневого, фиолетово-бурого или фиолетово-коричневого цвета с желтовато-белыми вкраплениями.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Растительные средства с диуретическим эффектом.

Код АТС С03В Х.

Биологически активные вещества листьев оказывают диуретическое, спазмолитическое, желчегонное действие; повышают секрецию желудочного сока, увеличивают в нем содержание свободной соляной кислоты, выводят из организма мочевину, мочевую кислоту, хлориды.

Показания к применению. Острые и хронические заболевания почек; холециститы; отеки, обусловленные нарушенной функцией почек или сердечной недостаточностью (в составе комплексной терапии).

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата; гиперацидный гастрит, язвенная болезнь.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

По назначению врача, если польза от применения для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат не назначают детям до 3 лет.

Способ применения и дозы. 1 десертную ложку листьев поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 2 раза в сутки за 20-30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/2 стакана; детям в возрасте 12-14 лет – по 1/3 стакана, 7-12 лет – по 1 столовой ложке, 3-7 лет – по 1 десертной ложке. При холециститах принимать после еды. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2 раза в сутки за 20-30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/2 стакана; детям в возрасте 12-14 лет – по 1/3 стакана, 7-12 лет – по 1 столовой ложке, 3-7 лет – по 1 десертной ложке.

При холециститах принимать после еды.

Курс лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. При передозировке возможна боль в области почек, печени, желудка.

Побочные эффекты. Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 4 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 50 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу