

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України

25.01.12 № 47

Реєстраційне посвідчення  
№ UA/5789/01/01

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату  
**ПОДОРОЖНИКА ВЕЛИКОГО ЛИСТЯ**  
(PLANTAGINIS MAJORIS FOLIA)

**Склад лікарського засобу:**

*діюча речовина:* подорожника великого листя.

**Лікарська форма.** Листя.

Шматочки листя різної форми зеленого, коричневатого-зеленого кольору.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

**Фармакотерапевтична група.** Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A.

Біологічно активні речовини препарату чинять відхаркувальну, протизапальну, знеболювальну, кровоспинну, ранозагоювальну, бактеріостатичну дію; посилюють функціональну активність епітелію дихальних шляхів, сприяють виділенню і евакуації слизу з них, зменшують кашель; посилюють секрецію шлункового соку, підвищують кислотність; сприяють очищенню ранових та виразкових поверхонь від гноєтворних бактерій, посилюють процеси грануляції поверхонь уражених тканин.

**Показання для застосування.**

Захворювання дихальних шляхів (бронхіти, коклюш, пневмосклероз, туберкульоз легенів), шлунково-кишкові захворювання (гастрити зі зниженою кислотністю, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, ентерити і ентероколіти) - у складі комплексної терапії. Зовнішньо застосовують як ранозагоювальний засіб.

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Гіперацидний гастрит, виразкова хвороба шлунка з підвищеною кислотністю; підвищене згортання крові та схильність до тромбоутворення, рефлюкс-езофагіт.

**Особливі застереження.**

***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

За призначенням лікаря у тому випадку, якщо на його думку, користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.** Не впливає.

**Діти.** Препарат застосовують дітям старше 1 року за призначенням лікаря.

**Спосіб застосування та дози.**

2 столові ложки листя помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплому вигляді по 1/3 склянки 3 рази на добу за 10-15 хв до їди; дітям віком 1-3 роки – по 1 чайній ложці, 2-5 років – по 1 десертній ложці, 5-10 років – по 1 столовій ложці, 10-14 років – по 1/4 склянки 3 рази на добу за 10-15 хв до їди.

3 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Дорослим приймати у теплому вигляді по 1/2 склянки 4 рази на добу за 10-15 хв до їди; дітям віком 1-3 років – по 1 десертній ложці, 3-5 років – по 2 десертні ложки, 5-10 років – по 2 столові ложки, 10-14 років – по 1/3-1/2 склянки 3 рази на добу за 10-15 хв до їди.

Зовнішньо – змочують настоем марлеву серветку і прикладають на уражені ділянки шкіри. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

**Передозування.** Повідомлення відсутні.

**Побічні ефекти.**

Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри), печія.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не застосовувати одночасно з протикашльовими препаратами та лікарськими засобами, що зменшують виділення мокротиння.

**Термін придатності.** 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

**Упаковка.**

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доосьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ Министерства  
здравоохранения Украины  
25.01.12 № 47  
Регистрационное удостоверение  
№ UA/5789/01/01

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**  
**ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЛИСТЯ**  
**(PLANTAGINIS MAJORIS FOLIA)**

**Состав лекарственного средства:**

*действующее вещество:* подорожника большого листья.

**Лекарственная форма.** Листья.

Кусочки листьев различной формы зеленого, коричневато-зеленого цвета.

**Название и местонахождение производителя.**

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

**Фармакотерапевтическая группа.** Отхаркивающие средства. Код АТС R05C A.

Биологически активные вещества растения оказывают отхаркивающее, противовоспалительное, обезболивающее, кровоостанавливающее, ранозаживляющее, бактериостатическое действие; усиливают функциональную активность эпителия дыхательных путей, способствуют выделению и эвакуации слизи из них, уменьшают кашель; усиливают секрецию желудочного сока, повышают кислотность; способствуют очищению раневых и язвенных поверхностей от гнилостных бактерий, усиливают процессы грануляции поверхностей пораженных тканей.

**Показания к применению.**

Заболевания дыхательных путей (бронхиты, коклюш, пневмо-склероз, туберкулез легких), желудочно-кишечные заболевания (гастриты с пониженной кислотностью, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, энтериты и энтероколиты) – в составе комплексной терапии. Наружно применяют как ранозаживляющее средство.

**Противопоказания.**

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка с повышенной кислотностью; повышенная свертываемость крови и склонность к тромбообразованию, рефлюкс-эзофагит.

**Особые предостережения.**

***Применение в период беременности или кормления грудью.***

По назначению врача в том случае, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.** Не влияет.

**Дети.** Препарат применяют детям старше 1 года по назначению врача.

**Способ применения и дозы.**

2 столовые ложки листьев поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре на протяжении 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Взрослым принимать в теплом виде по 1/3 стакана 3 раза в сутки за 10-15 мин до еды; детям 1-3 года – по 1 чайной ложке, 3-5 лет – по 1 десертной ложке, 5-10 лет – по 1 столовой ложке, 10-14 лет – по 1/4 стакана 3 раза в сутки за 10-15 мин до еды.

3 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Взрослым принимать в теплом виде по 1/2 стакана 4 раза в сутки за 10-15 мин до еды; детям 1-3 года – по 1 десертной ложке, 3-5 лет – по 2 десертные ложки, 5-10 лет – по 2 столовые ложки, 10-14 лет – по 1/3-1/2 стакана 3 раза в сутки за 10-15 мин до еды.

Перед применением настой взболтать.

Наружно – смачивают настоем марлевую салфетку и прикладывают на пораженные участки кожи.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

**Передозировка.** Сообщения отсутствуют.

**Побочные эффекты.**

Аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи), изжога.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.**

Не применять одновременно с противокашлевыми препаратами и лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты.

**Срок годности.** 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.**

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

**Упаковка.**

По 50 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доось та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу