

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ПОЛИНУ ГІРКОГО ТРАВА
(*ARTEMISIAE ABSINTHII HERBA*)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: полину гіркою трава.

Лікарська форма. Трава.

Шматочки листя, стебел, кошиків різної форми сірого, зеленого, жовтого, зеленувато-сірого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Засоби для підвищення апетиту. Код АТС А15.

Біологічно активні речовини препарату збуджують апетит, стимулюють функцію залоз органів травлення, підвищують секрецію жовчі, панкреатичного і шлункового соків, чинять протизапальну, антисептичну дію.

Показання для застосування. Для підвищення апетиту і покращання секреторної діяльності органів травлення при гастритах з пониженою секреторною функцією шлунка; у складі комплексної терапії холециститів, дискінезій жовчних шляхів.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, жовчокам'яна хвороба; наявність в анамнезі кровотеч із органів малого таза; анемія; епілепсія.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано (препарат підвищує тонус матки).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат застосовують дітям старше 5 років.

Спосіб застосування та дози. 2 чайні ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв.

Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою доведи кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу.

3 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати настій у теплому вигляді за 30 хв до їди: дорослим та дітям старше 14 років – по 1 столовій ложці 3-4 рази на добу, дітям віком 10-14 років – по 1 десертній ложці 3 рази на добу, 5-10 років – по 1 чайній ложці 3 рази на добу.

Курс лікування – 2-3 тижні. За призначенням лікаря курс можна повторювати. Між курсами обов'язкові перерви до 2 місяців.

Передозування. При тривалому застосуванні можливі атонічні закрепи. Прийом у підвищених дозах, особливо тривалий, може призвести до отруєння – розвитку судом, галюцинацій та викликати так звану «полинну» епілепсію. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти. Можливі реакції підвищеної чутливості (в т.ч. гіперемія, висипання, свербіж), нудота, блювання. При появі побічних реакцій препарат відмінюють.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакетах № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
25.01.12 № 47
Регистрационное удостоверение
№ UA/5479/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ ТРАВА
(ARTEMISIAE ABSINTHII HERBA)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: полыни горькой трава.

Лекарственная форма. Трава.

Кусочки листьев, стеблей, корзинок различной формы серого, зеленого, желтого, зеленовато-серого цвета.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Средства для повышения аппетита. Код АТС А15.

Биологически активные вещества препарата возбуждают аппетит, стимулируют функцию желез органов пищеварения, усиливают секрецию желчи, панкреатического и желудочного соков, проявляют противовоспалительное, антисептическое действие.

Показания к применению. Для повышения аппетита и улучшения секреторной деятельности органов пищеварения при гастритах со сниженной секреторной функцией желудка; в составе комплексной терапии холециститов, дискинезий желчных путей.

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки, желчекаменная болезнь; наличие в анамнезе кровотечений из органов малого таза; анемия; эпилепсия.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Противопоказано (повышает тонус матки).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Препарат применяют детям старше 5 лет.

Способ применения и дозы. 2 чайные ложки травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1 столовой ложке 3-4 раза в сутки, детям в возрасте 10-14 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в сутки, 5-10 лет – по 1 чайной ложке 3 раза в сутки.

3 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде за 30 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1 столовой ложке 3-4 раза в сутки, детям в возрасте 10-14 лет – по 1 десертной ложке 3 раза в сутки, 5-10 лет – по 1 чайной ложке 3 раза в сутки.

Курс лечения – 2-3 недели. По назначению врача курс можно повторять. Между курсами обязательные перерывы до 2 месяцев.

Передозировка. При длительном применении возможны атонические запоры. Прием в повышенных дозах, особенно продолжительный, может привести к отравлению – развитию судорог, галлюцинаций и вызвать так называемую «полынную» эпилепсию. Лечение симптоматическое.

Побочные эффекты. Возможны реакции повышенной чувствительности (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд), тошнота, рвота. При возникновении побочных реакций препарат отменяют.

Взаимодействие с лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 2 года.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 75 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакетах № 20.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу