

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

09/13/13 № 2006

Регістраційне посвідчення

№ 009/5534/04/09

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу
ПОЛ-ПАЛА
(POL-PALA)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: ерви шерстистої трава.

1 пачка містить: трава ерви шерстистої – 50 г.

допоміжні речовини: відсутні.

Лікарська форма. Трава.

Листя, суцвіття, квітки, плоди, шматочки стебел, коренів різної форми. Колір сірувато-зелений.

Фармакотерапевтична група. Код АТХ. Діуретичні засоби. Код АТС С03В Х.

Фармакологічні властивості.

Трава ерви шерстистої (пол-пала) містить флавоноїди, полісахариди, слиз, органічні кислоти, дубильні речовини, кумарини, сапоніни.

Препарати ерви шерстистої проявляють салуретичний та діуретичний ефект, який супроводжується збільшенням виділення іонів натрію та кальцію, зниженням вмісту сечовини у плазмі крові.

Клінічні характеристики.

Показання для застосування. У складі комплексної терапії запальних захворювань нирок та сечовивідних шляхів (хронічний пієлонефрит, цистит, уретрит), сечокислого діатезу (початкові стадії сечокам'яної хвороби), а також як сечогінний засіб при діабетичній нефропатії, артеріальній гіпертензії та набряках різного походження.

Протипоказання. Гіперчутливість до препарату. Остеопороз; захворювання, що супроводжуються підвищеним виділенням Ca^{2+} (у т.ч. рахіт, гіпопаратиреоз, ниркова остеодистрофія). Наявність каменів, що перевищують діаметр сечоводу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Інформація щодо досвіду застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутня.

56

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Немає даних.

Спосіб застосування та дози. 2 столові ложки трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хвилин. Охолодити при кімнатній температурі 45 хвилин, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Дорослим приймати у теплом вигляді по 1/4-1/2 склянки 2-3 рази на добу за 15-20 хвилин до їди. Перед вживанням настій рекомендується збовтати.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 дб.

Курс лікування становить 10-30 днів.

Діти. Препарат протипоказаний дітям.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні реакції. У поодиноких випадках можлива нудота. Алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипи, свербіж та набряк шкіри).

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

В оригінальній упаковці при температурі не вище 30 °С.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник/заявник. ПрАТ Ліктрави, Україна.

Місцезнаходження виробника та адреса місця впровадження діяльності.
Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, шосе Київське, будинок 21.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного дос'є та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

57