

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

03.02.10 № 82

Реєстраційне посвідчення
№ *UA/5880/01/01*

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ПРОНОСНИЙ ЗБІР № 1
(LAXANTES SPECIES № 1)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г збору містять: крушини кори 0,5 г, кропиви листя 0,333 г, деревію трави 0,167 г.

Лікарська форма. Збір.

Суміш неоднорідних шматочків листя, стебел, кори темно-зеленого, сіро-бурого, темно-бурого кольору з білуватими краплями.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Проносні засоби. Код АТС А06А Х.

Біологічно активні речовини збору чинять м'яку проносну дію за рахунок посилення перистальтики кишечника.

Показання для застосування. Хронічні запори.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до інших рослин родини Айстрових (Складноцвітні). Гастрит, гастроентерит, коліт, хронічні захворювання шлунка і кишечника у період загострення, кишкові кровотечі та непрохідність, запори неврогенного та ендокринного походження, спастичні запори, синдром "гострого" живота, апендицит, запальні процеси у черевній порожнині, гострі пропасні стани, підвищене згортання крові, артеріальна гіпертензія, кровотечі, спричинені кістою, поліпами та пухлинами матки та її додатків.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям старше 12 років.

Спосіб застосування та дози.

2 десертні ложки збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою.

Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл. Приймати у теплому вигляді на ніч і вранці дорослим по 1/2 склянки, дітям старше 12 років – по 1/4-1/3 склянки. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити в скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Приймати у теплому вигляді на ніч і вранці дорослим по 1 склянці, дітям старше 12 років – по 1/2–2/3 склянки.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

При передозуванні можливі колікоподібний біль у животі, тенезми, відчуття дискомфорту. При виникненні вказаних симптомів слід відмінити препарат. Лікування – симптоматичне.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції при гіперчутливості до препарату. При тривалому застосуванні можуть розвинутися: діарея з метаболічними порушеннями, дегідратація, зниження функції ферментів кишечника, атонія товстого кишечника.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 2 г у фільтр-пакетах в упаковці № 20.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
03.02.12 № 82
Регистрационное удостоверение
№ UA/5880/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

СЛАБИТЕЛЬНЫЙ СБОР № 1
(LAXANTES SPECIES № 1)

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1 г сбора содержат: крушины коры 0,50 г, крапивы листьев 0,333 г, тысячелистника травы 0,167 г.

Лекарственная форма. Сбор.

Смесь неоднородных кусочков листьев, стеблей, коры темно-зеленого, серо-бурого, темно-бурого цвета с беловатыми вкраплениями.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Слабительные средства. Код АТС А06А Х.

Биологически активные вещества сбора оказывают мягкое слабительное действие за счет усиления перистальтики кишечника.

Показания к применению. Хронические запоры.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или к другим растениям семейства Астровых (Сложноцветных). Гастрит, гастроэнтерит, колит, хронические заболевания желудка и кишечника в период обострения, кишечные кровотечения и непроходимость, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, синдром "острого" живота, аппендицит, воспалительные процессы в брюшной полости, острые лихорадочные состояния, повышенная свертываемость крови, артериальная гипертензия, кровотечения, вызванные кистой, полипами и опухолями матки и ее придатков.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат применяют детям старше 12 лет.

Способ применения и дозы.

2 десертные ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре на протяжении 45 мин, процедить, остаток отжать в

процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде взрослым по 1/2 стакана на ночь и утром, детям старше 12 лет – по 1/4-1/3 стакана на ночь и утром. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде на ночь и утром взрослым – по 1 стакану, детям старше 12 лет – по 1/2-2/3 стакана.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка.

При передозировке возможны коликообразная боль в животе, тенезмы, ощущение дискомфорта. При возникновении указанных симптомов необходимо отменить препарат. Лечение – симптоматическое.

Побочные эффекты.

Возможны аллергические реакции при гиперчувствительности к препарату. При длительном применении могут развиваться: диарея с метаболическими нарушениями, дегидратация, снижение функции ферментов кишечника, атония толстого кишечника.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 2 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 75 г в пачках с внутренним пакетом, по 2 г в фильтр-пакетах в упаковке № 20.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного дося та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу