

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
САДИФИТ
(SADIPHYTUM)

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: 1 г сбора содержит: топинамбура клубней 0,2 г, стевии листьев 0,2 г, черники побегов 0,2 г, фасоли створок плодов 0,2 г, чая зеленого 0,15 г, мяты перечной листьев 0,05 г.

Лекарственная форма. Сбор.

Смесь неоднородных кусочков зеленого, темно-зеленого, серовато-зеленого, буровато-зеленого, желтовато-белого, светло-бурого или буро-коричневого цвета.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Антидиабетические средства. Код АТС А10 Х.

Биологически активные вещества сбора оказывают гипогликемическое действие при сахарном диабете II типа легкой и средней тяжести, что дает возможность в ряде случаев снизить суточные дозы пероральных антидиабетических средств; регулируют функцию пищеварительного тракта, стимулируют активность поджелудочной железы, нормализуют обменные процессы, снижают уровень холестерина в крови, проявляют противовоспалительное, желчегонное и мочегонное свойства.

Показания для применения.

Легкие и средние формы сахарного диабета II типа; заболевания желудочно-кишечного тракта (энтероколит, хронический панкреатит, хронический холецистит) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Бронхиальная астма, обострение хронического панкреатита.

Надлежащие меры безопасности при применении.

С осторожностью применять больным с обострением хронического энтероколита, с дискинезией желчевыводящих путей. У пациентов с желудочно-пищеводным рефлюксом возможно увеличение изжоги.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Неизвестна.

Дети. Препарат применяют детям от 7 лет по назначению врача.

Способ применения и дозы.

1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 300 мл (1,5 стакана) горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 300 мл. Применять в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды в течение 20-30 дней: взрослым и детям от 14 лет – по 1/2 стакана, детям 10-14 лет – по 1/3-1/4 стакана, 7-10 лет – по 2 столовые ложки. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 300 мл (1,5 стакана) кипятка, закрыть и настаивать не менее 1 часа. Настаивать рекомендуется в термосе. Применять в теплом виде 3 раза в сутки за 30 мин до еды в течение 20-30 дней: взрослым и детям от 14 лет – по 1/2 стакана, детям 10-14 лет – по 1/3-1/4 стакана, 7-10 лет – по

2 столовые ложки.

Через 7-10 дней курс лечения рекомендуется повторить (после консультации с врачом).

Передозировка.

Несоблюдение рекомендованных доз может привести к боли в области сердца из-за содержания мяты перечной.

Побочные эффекты.

Возможны аллергические реакции (в т.ч. гиперемия, сыпь, зуд, отек кожи, крапивница, контактный дерматит).

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 2 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 75 г в пачках с внутренним пакетом, по 3 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с внутренним пакетом, по 3 г в фильтр-пакете в индивидуальном пакетике № 20 в пачке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доповіді та достовірно
відомими даними щодо застосування
мікробіологічного засобу

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
230512 № 373
Реєстраційне посвідчення
№ UA/614/04/08

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
САДІФІТ
(SADIPHYTUM)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: 1 г збору містить: топінамбура бульб 0,2 г, стевії листя 0,2 г, чорниці пагонів 0,2 г, квасолі ступок плодів 0,2 г, чаю зеленого 0,15 г, м'яти перцевої листя 0,05 г.

Лікарська форма. Збір.

Суміш неоднорідних шматочків зеленого, темно-зеленого, сірувато-зеленого, буровато-зеленого, жовтувато-білого, світло-бурого чи буро-коричневого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Антидіабетичні засоби. Код АТС А10 Х.

Біологічно активні речовини збору чинять гіпоглікемічну дію при цукровому діабеті II типу легкої та середньої тяжкості, що дає можливість у ряді випадків знизити добові дози пероральних антидіабетичних засобів; регулюють функцію травного тракту, стимулюють активність підшлункової залози, нормалізують обмінні процеси, знижують рівень холестерину у крові, виявляють протизапальні, жовчогінні та сечогінні властивості.

Показання для застосування.

Легкі та середні форми цукрового діабету II типу, захворювання травного тракту (ентероколіт, хронічний панкреатит, хронічний холецистит) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Бронхіальна астма, загострення хронічного панкреатиту.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

З обережністю застосовувати хворим із загостренням хронічного ентероколіту, із дискінезією жовчовивідних шляхів. У пацієнтів із шлунково-стравохідним рефлюксом можливе збільшення печії.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Протипоказано.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Невідома.

Діти. Препарат застосовують дітям від 7 років за призначенням лікаря.

Спосіб застосування та дози.

1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 300 мл (1,5 склянки) гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 300 мл. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 20-30 днів: дорослим та дітям від 14 років – по 1/2 склянки, дітям 10-14 років – по 1/3-1/4 склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 300 мл (1,5 склянки) окропу, закрити і настоювати не менше 1 години. Настоювати рекомендується у термосі. Застосовувати у теплому вигляді 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 20-30 днів: дорослим та дітям від 14 років – по 1/2 склянки, дітям 10-14 років – по 1/3-1/4 склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки.

Через 7-10 днів курс лікування рекомендується повторити (після консультації з лікарем).

Передозування.

Недотримання рекомендованих доз може призвести до болу у ділянці серця через вміст м'яти перцевої.

Побічні ефекти.

Можливі алергічні реакції (у т.ч. гіперемія, висипання, свербіж, набряк шкіри, кропив'янка, контактний дерматит).

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготований настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 днів.

Упаковка.

По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 3 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом, по 3 г у фільтр-пакеті в індивідуальному пакетику № 20 у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного дозволу та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу