

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ФЕНХЕЛЮ ПЛОДИ
(FOENICULI FRUCTUS)

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: фенхелю плоди.

Лікарська форма. Плоди.

Плоди – вислоплодники, що розпадаються на два напівплодики (мерикарпії). Зовнішня сторона мерикарпії випукла, внутрішня – плоска. Кожен мерикарпій з п'ятьма дуже виступаючими поздовжніми реберцями. Колір зеленувато-бурий.

Назва і місцезнаходження виробника.

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Засоби, що застосовуються при функціональних розладах травного тракту. Код АТС А03А Х.

Біологічно активні речовини плодів чинять секретолітичну, спазмолітичну, вітрогінну, протимікробну та слабку сечогінну дію.

Показання для застосування. Спазми кишечника, метеоризм, запальні захворювання дихальних шляхів (бронхіти, трахеїти) – у складі комплексної терапії.

Протипоказання. Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату.

Особливі застереження.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Протипоказано у період вагітності. Посилює лактацію у період годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Не впливає.

Діти.

Препарат застосовують дітям старше 6 місяців.

Спосіб застосування та дози. 1 столову ложку плодів помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 3-4 рази на добу: дорослим та дітям старше 14 років – по 1/3 склянки, дітям віком 10-14 років – по 1/4 склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 десертній ложці, дітям віком від 6 місяців до 3 років – по 1 чайній ложці.

Перед застосуванням настій збовтати.

Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування. Повідомлення відсутні.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С. Приготований настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 50 г у пачках з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ФЕНХЕЛЯ ПЛОДЫ
(FOENICULI FRUCTUS)

Состав лекарственного средства:

действующее вещество: фенхеля плоды.

Лекарственная форма. Плоды.

Плоды – вислоплодники, распадающиеся на два полуплодика (мерикарпия). Наружная сторона мерикарпия выпуклая, внутренняя – плоская. Каждый мерикарпий с пятью сильно выступающими продольными ребрышками. Цвет зеленовато-бурый.

Название и местонахождение производителя.

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при функциональных расстройствах пищеварительного тракта. Код АТС А03А Х.

Биологически активные вещества плодов оказывают секретолитическое, спазмолитическое, ветрогонное, противомикробное и слабое мочегонное действие.

Показания к применению. Спазмы кишечника, метеоризм, воспалительные заболевания дыхательных путей (бронхиты, трахеиты) – в составе комплексной терапии.

Противопоказания. Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Противопоказано в период беременности. Повышает лактацию в период кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Не влияет.

Дети.

Препарат применяют детям старше 6 месяцев.

Способ применения и дозы. 1 столовую ложку плодов поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 3-4 раза в сутки: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/3 стакана, детям 10-14 лет – по 1/4 стакана, 7-10 лет – по 2 столовые ложки, 3-7 лет – по 1 десертной ложке, детям в возрасте старше 6 месяцев до 3 лет – по 1 чайной ложке.

Перед применением настой взболтать.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка. Сообщения отсутствуют.

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 25 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 50 г в пачках с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного досьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу