

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
22.11.11 № 810

Регістраційне посвідчення
№ UA/5803/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

ФІАЛКИ ТРАВА
(VIOLAE HERBA)

Склад лікарського засобу:
діюча речовина: фіалки трава.

Лікарська форма. Трава.

Шматочки стебел, листя, квіток, плодів зеленого, світло-зеленого або жовтувато-зеленого кольору з фіолетовими, синіми, темно-синіми, жовтими, світло-жовтими, блідо-фіолетовими краплями та поодинокі насіння світло-бурого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.
ЗАТ «Ліктрави».
Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

Фармакотерапевтична група. Відхаркувальні засоби. Код АТС R05C A.

Біологічно активні речовини препарату чинять антисептичну, протизапальну, бронхолітичну, відхаркувальну, слабку діуретичну, жовчогінну і спазмолітичну дію.

Показання для застосування.
Захворювання верхніх дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем з утрудненим відходженням мокротиння (гострі та хронічні бронхіти, бронхопневмонії, коклюш), запальні захворювання нирок і сечового міхура, сечокам'яна хвороба – у складі комплексної терапії.

Протипоказання.
Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату або до саліцилатів.
Гломерулонефрит, гепатит.

Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
За призначенням лікаря у тому випадку, коли користь для матері переважає потенційний ризик для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Препарат застосовують дітям старше 3 років.

Спосіб застосування та дози.
1 столову ложку трави помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком старше 14 років – по 1/3-1/2 склянки, дітям віком 12-14 років – по 1/3 склянки, 7-12 років – по 2 столові ложки, 3-7 років – по 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати. 2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хвилин. Приймати у теплому вигляді 3-4 рази на добу після їди: дорослим та дітям віком старше 14 років – по 1/2-1 склянці, дітям віком 12-14 років – по 1/2 склянки, 7-12 років – по 1/3 склянки, 3-7 років – по 2 столові ложки. Тривалість курсу лікування визначає лікар індивідуально.

Передозування.

Передозування та тривале застосування препарату призводять іноді до виникнення нудоти, блювання, діареї, алергічних висипань на шкірі.

Побічні ефекти.

При гіперчутливості до препарату можливі алергічні реакції, у т.ч. висипання на шкірі, нудота, блювання, діарея.

При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідома.

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

Упаковка.

По 60 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 в пачці або в пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
22.11.11 № 810
Регистрационное удостоверение
№ УА/5803/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
ФИАЛКИ ТРАВА
(VIOLAE HERBA)

Состав лекарственного средства:
действующее вещество: фиалки трава.

Лекарственная форма. Трава.

Кусочки стеблей, листьев, цветков, плодов зелёного, светло-зелёного или желтовато-зеленого цвета с фиолетовыми, синими, темно-синими, желтыми, светло-жёлтыми, бледно-фиолетовыми вкраплениями и отдельные семена светло-бурого цвета

Название и местонахождение производителя.
ЗАО «Лектравы».
Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

Фармакотерапевтическая группа. Отхаркивающие средства. Код АТС R05C A.

Биологически активные вещества препарата оказывают антисептическое, противовоспалительное, бронхолитическое, отхаркивающее, слабое диуретическое, желчегонное и спазмолитическое действие.

Показания к применению.

Заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем с затрудненным отделением мокроты (острые и хронические бронхиты, бронхопневмонии, коклюш), воспалительные заболевания почек и мочевого пузыря, мочекаменная болезнь – в составе комплексной терапии.

Противопоказания.

Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата или к салицилатам.
Гломерулонефрит, гепатит.

Особые предостережения.

Применение в период беременности или кормления грудью.

По назначению врача в том случае, если польза для матери превышает потенциальный риск для плода/ребенка.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Препарат применяют детям старше 3 лет.

Способ применения и дозы.

1 столовую ложку травы поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/3-1/2 стакана, детям 12-14 лет – по 1/3 стакана, 7-12 лет – по 2 столовые ложки, 3-7 лет – по 1 столовой ложке.. Перед применением настоев взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 3-4 раза в сутки после еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/2-1 стакану, детям 12-14 лет – по 1/2 стакана, 7-12 лет – по 1/3 стакана, 3- 7 лет – по 2 столовые ложки.

Длительность курса лечения определяет врач индивидуально.

Передозировка.

Передозировка и длительное применение препарата приводят иногда к возникновению тошноты, рвоты, диареи, аллергической сыпи на коже.

Побочные эффекты.

При гиперчувствительности к препарату возможны аллергические реакции, в т. ч. сыпь на коже, тошнота, рвота, диарея.

При появлении побочных реакций необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Неизвестно.

Срок годности. 3 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

Упаковка.

По 60 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Уточнено і матеріалами
реєстраційного досяг та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу