

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

06.03.2015 № 124

Регістраційне посвідчення
№ UA/14932/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування лікарського засобу

ФІТОНЕФРОЛ
PHYTONEPHROL

Склад:

діючі речовини: 1 г збору містить мучниці листя (*Uvae ursi folia*) 400 мг, календули квіток (*Calendulae flores*) 200 мг, кропу пахучого плодів (*Anethi graveolentis fructus*) 200 мг, елеутерококу колючого кореневищ з коренями (*Eleutherococci senticosi rhizomata et radices*) 100 мг, м'яти перцевої листя (*Menthae piperitae folia*) 100 мг.

Лікарська форма. Збір.

Основні фізико-хімічні властивості:

подрібнена сировина: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-зеленого кольору з жовто-оранжевими, темно-зеленими, світло-зеленими, жовтувато-білими, сірувато-коричневими вкрапленнями;

порошок крупний: суміш неоднорідних шматочків жовтувато-зеленого кольору з жовто-оранжевими, темно-зеленими, жовтувато-білими, сірувато-коричневими вкрапленнями.

Фармакотерапевтична група.

Інші препарати для лікування урологічних захворювань. Код АТХ G04BX.

Фармакологічні властивості.

Препарат чинить діуретичну, протимікробну, протизапальну, спазмолітичну дію.

Клінічні характеристики.

Показання.

Препарат застосовують у комплексній терапії запальних захворювань нирок та сечовивідних шляхів.

Противоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Особливі заходи безпеки.

При сечокам'яній хворобі застосування препарату необхідно погодити з лікарем-урологом.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Не описана.

Особливості застосування.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Противоказано застосування препарату у період вагітності або годування груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами.

Не вивчена.

Спосіб застосування та дози.

2 столові ложки препарату помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водяній бані 30 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 10 хв, процідити, залишок віджати до процідженого відвару. Об'єм відвару довести кип'яченою водою до 200 мл.

Приймати у теплом вигляді по 1/3 склянки 3 рази на добу за 30 хв до їди протягом 2 тижнів.

Перед застосуванням відвар збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 100 мл окропу, закрити і настоювати 30 хв. Фільтр-пакети віджати. Об'єм водної витяжки довести кип'яченою водою до 100 мл.

Приймати у теплом вигляді по 100 мл 3 рази на добу за 20-30 хв до їди протягом 2-4 тижнів.

Приготовлену водну витяжку зберігати у холодильнику (при температурі 2-8 °С) не більше 2 діб.

Діти.

Препарат не застосовують дітям до 12 років.

Передозування.

При тривалому застосуванні препарату у дозах, які перевищують рекомендовані, можливе загострення запальних явищ в сечовивідній системі та забарвлення сечі в темно-зелений колір.

Лікування симптоматичне.

Побічні реакції.

Можливі алергічні реакції.

Термін придатності. 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 50 г у пачках із внутрішнім пакетом; по 1,5 г у фільтр-пакеті, по 20 фільтр-пакетів у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Виробник.

ПрАТ «Ліктрави».

Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності.

Україна, 10001, Житомирська обл., м. Житомир, цюсе Київське, буд. 21.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

Узгоджено з матеріалами
реєстраційного доосьє та достовірно
відомими даними щодо застосування
лікарського засобу

Узгоджено з матеріалами реєстраційного доосьє та достовірно відомими даними щодо застосування лікарського засобу