

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ Міністерства охорони  
здоров'я України

28.03.18 № 213

Реєстраційне посвідчення

№ UA/6056/01/01

**ІНСТРУКЦІЯ**  
для медичного застосування препарату  
**ШЛУНКОВИЙ ЗБІР № 3**  
(**STOMACHICAE SPECIES № 3**)

**Склад лікарського засобу:**

*діючі речовини:* 1 г збору містить: крушини кори 300 мг, кропиви листя 300 мг, м'яти перцевої листя 200 мг, валеріани кореневищ з коренями 100 мг, лепехи кореневищ 100 мг.

**Лікарська форма.** Збір.

Суміш неоднорідних шматочків темно-зеленого, сіро-бурого, темно-бурого кольору з оранжевими і жовтуватобілими включеннями.

**Назва і місцезнаходження виробника.**

ЗАТ «Ліктрави».

Україна, 10001, м. Житомир, Київське шосе, 21.

**Фармакотерапевтична група.**

Засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси. Код АТС А16А Х.

Біологічно активні речовини збору спричиняють подразнення рецепторів слизової оболонки шлунка і кишечника, що зумовлює регулюючий вплив на функції, у тому числі моторику, зазначених відділів шлунково-кишкового тракту; чинять легку проносну, спазмолітичну, седативну, протизапальну, жовчогінну дію.

**Показання для застосування.**

Спазми шлунково-кишкового тракту, хронічні гастрити та холециститу, дискінезії жовчних шляхів, запори – у складі комплексної терапії.

**Протипоказання.**

Гіперчутливість до біологічно активних речовин препарату. Бронхіальна астма, запори неврогенного та ендокринного походження, спастичні запори, синдром „гострого” живота, апендицит, гострий гастроентероколіт, інші запальні процеси у черевній порожнині, шлунку, кишечника, підвищена кислотність шлункового соку, кишкова непрохідність; виразковий коліт; кровотечі шлунково-кишкові, маткові (не пов'язані з менструальним циклом), гострі пропасні стани, депресія та інші захворювання, що супроводжуються пригніченням діяльності центральної нервової системи.

**Особливості застосування.**

У пацієнтів із шлунково-стравохідним рефлюксом можливе посилення печії.

**Особливі застереження.**

*Застосування у період вагітності або годування груддю.* Протипоказано.

*Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.* Не впливає.

**Діти.** Препарат застосовують дітям старше 5 років за призначенням лікаря.

**Спосіб застосування та дози.**

1 столову ложку збору помістити в емальований посуд, залити 200 мл гарячої кип'яченої води, закрити кришкою і настоювати на киплячій водянній бані 15 хв. Охолодити при кімнатній температурі протягом 45 хв, процідити, залишок віджати до процідженого настою. Об'єм настою довести кип'яченою водою до 200 мл.

Застосовувати у теплому вигляді 2 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим і дітям старше 14 років – по 1/2 склянки, дітям віком 10-14 років – по 1/3 склянки, 7-10 років – по 2 столові ложки, 5-7 років – по 1 столовій ложці. Перед застосуванням настій збовтати.

2 фільтр-пакети помістити у скляний або емальований посуд, залити 200 мл окропу, закрити і настоювати 15 хв. Застосовувати у теплому вигляді 2 рази на добу за 15-20 хв до їди: дорослим і дітям старше 14 років – по 1 склянці, дітям віком 10-14 років – по 1/2 склянки, 7-10 років – по 1/3 склянки, 5-7 років – по 2 столові ложки.

Курс лікування – 20-25 днів. Повторні курси проводять після 10-12-денної перерви.

**Передозування.**

Недотримання рекомендованих доз та тривале застосування може призвести до колікоподібного болю у животі, тенезмів, відчуття дискомфорту, діареї з метаболічними порушеннями, дегідратації, зниження функцій ферментів кишечника, атонії товстого кишечника, болю у ділянці серця.

**Побічні ефекти.**

Колікоподібний біль у животі, печія; можливі алергічні реакції (в т.ч. висипання, набряк шкіри); пригнічення емоційних реакцій, психічна депресія, безсоння, головний біль, тривога, брадикардія, аритмія. При появі побічних реакцій слід припинити прийом препарату та звернутися до лікаря.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідомі.

**Термін придатності.** 2 роки.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці у недоступному для дітей місці при температурі не вище 30 °С. Приготовлений настій – при температурі 8-15 °С не більше 2 діб.

**Упаковка.**

По 75 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 1,5 г у фільтр-пакеті № 20 у пачці або у пачці з внутрішнім пакетом.

**Категорія відпуску.** Без рецепта.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доось та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**

**ЖЕЛУДОЧНЫЙ СБОР № 3**  
**(STOMACHICAE SPECIES № 3)**

**Состав лекарственного средства:**

*действующие вещества:* 1 г сбора содержит: крушины коры 300 мг, крапивы листьев 300 мг, мяты перечной листьев 200 мг, валерианы корневищ с корнями 100 мг, айра корневищ 100 мг.

**Лекарственная форма.** Сбор.

Смесь неоднородных кусочков темно-зеленого, серо-бурого, темно-бурого цвета с оранжевыми и желтовато-белыми включениями.

**Название и местонахождение производителя.**

ЗАО «Лектравы».

Украина, 10001, г. Житомир, Киевское шоссе, 21.

**Фармакотерапевтическая группа.**

Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболические процессы.

Код АТС А16АХ.

Биологически активные вещества сбора вызывают раздражение рецепторов слизистой оболочки желудка и кишечника, что обуславливает регулирующее влияние на функции, в том числе моторику, указанных отделов желудочно-кишечного тракта; оказывают легкое слабительное, спазмолитическое, седативное, противовоспалительное, желчегонное действие.

**Показания к применению.**

Спазмы желудочно-кишечного тракта, хронические гастриты и холециститы, дискинезии желчных путей, запоры – в составе комплексной терапии.

**Противопоказания.** Гиперчувствительность к биологически активным веществам препарата. Бронхиальная астма, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, синдром «острого живота», аппендицит, острый гастроэнтероколит, другие воспалительные процессы в брюшной полости, желудке, кишечнике, повышенная кислотность желудочного сока, кишечная непроходимость, язвенный колит, кровотечения желудочно-кишечные, маточные (не связанные с менструальным циклом), острые лихорадочные состояния, депрессия и другие заболевания, сопровождающиеся угнетением деятельности центральной нервной системы.

**Особенности применения.** У пациентов с желудочно-пищеводным рефлюксом возможно усиление изжоги.

**Особые предостережения.**

*Применение в период беременности или кормления грудью.* Противопоказано.

**Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.** Не влияет.

**Дети.** Препарат применяют детям старше 5 лет по назначению врача.

**Способ применения и дозы.**

1 столовую ложку сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре в течение 45 мин, процедить, остаток отжать в процеженный настой. Объем настоя довести кипяченой водой до 200 мл. Применять в теплом виде 2 раза в сутки за 15-20 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1/2 стакана, детям в возрасте 10-14 лет – по 1/3 стакана, 7-10 лет – по 2 столовые ложки, 5-7 лет – по 1 столовой ложке. Перед применением настой взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 200 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Принимать в теплом виде 2 раза в сутки за 15-20 мин до еды: взрослым и детям старше 14 лет – по 1 стакану, детям в возрасте 10-14 лет – по 1/2 стакана, 7-10 лет – по 1/3 стакана, 5-7 лет – по 2 столовые ложки. Курс лечения – 20-25 дней. Повторные курсы проводят после 10-12-дневного перерыва.

**Передозировка.**

Несоблюдение рекомендованных доз и длительное применение может вызвать коликообразную боль в животе, тенезмы, ощущение дискомфорта, диарею с метаболическими нарушениями, дегидратацию, снижение функций ферментов кишечника, атонию толстого кишечника, боль в области сердца.

**Побочные эффекты.**

Коликообразная боль в животе, изжога; возможны аллергические реакции (в т.ч. сыпь, отек кожи); угнетение эмоциональных реакций, психическая депрессия, бессонница, головная боль, тревога, брадикардия, аритмия. При появлении побочных реакций необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.** Неизвестны.

**Срок годности.** 2 года.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

**Условия хранения.**

Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте при температуре не выше 30 °С. Приготовленный настой – при температуре 8-15 °С не более 2 суток.

**Упаковка.** По 75 г в пачках с внутренним пакетом, по 1,5 г в фильтр-пакете № 20 в пачке или в пачке с внутренним пакетом.

**Категория отпуска.** Без рецепта.

**Дата последнего пересмотра.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного доось та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу